



RS  
180  
J388  
1937  
v.1

Sugawara, Toshiyasu  
Honzo tsukan

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE  
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

---

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

---







問 顧  
井上通泰先生  
山田孝雄先生  
新村 出先生

正宗敦夫  
編纂  
校訂

# 本草通串

自一卷  
至三卷

合  
會社

日本古典全集刊行會壽梓

長嶋豊太郎精刻


本草綱目

RS  
180  
J358  
1937  
v. 1




本草通串





本草通串

凡例



一此編首載神農本草經者本草蓋無古於此也而次  
駢載異本者爲欲使覽者識其得失是非故不厭  
煩一一載其全文如字有異同雖的知其爲誤寫  
不敢妄改之要在覽者取舍他皆倣此


一庶物類纂所集錄非不浩漭惜夫所載始於圖經  
而欠本邦著書不爲無憾故予此編上自三皇下  
至清朝苟有說本草者逐次載之而次自經史子



集至九流百家裨官野乘言涉本草者逐次載之  
而次載本邦諸家本草說并和書歌書言關本草  
者等然隨和漢時代以雜載之爲欲使覽者的識  
其著書後先也則是予之創意命此編爲通串者  
爲此已覽者識之

一此編所載草類次第一從李時珍本草綱目故首  
載甘草

本草通串卷一



富山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

甜草

甘草味甘平倍力金瘡腫解毒久服輕身延年

神農本草經

○大觀  
本草

本草經曰甘草一名美草一名蜜甘

神農本草經  
太平御覽

甘草氣味甘平無毒主治五臟六腑寒熱邪氣堅筋  
骨長肌肉倍氣力金瘡瘡解毒又服輕身延年

○本經  
本

甘草綱目

甘草味甘平無毒主五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長  
肌肉倍氣力金瘡瘡解毒溫中下氣煩滿短氣傷臟  
欬嗽止渴通經脈利血氣解百藥毒為九土之精安  
和七十二種石一百二十種草久服輕身延年

神農  
本草

經疏  
○吳  
懷祖  
輯要

甘草味甘平主五藏六府寒熱邪氣堅筋骨長肌肉

倍力金瘡槐解毒久服輕身延年

神農本草經  
○百種錄

甘艸味甘平主五藏六府寒熱邪氣堅筋骨長肌肉

倍力金創槐解毒久服輕身延年生川谷

神農本草經  
○孫星

衍

甘草國老味甘平無毒主五藏六腑寒熱邪氣堅筋

骨長肌肉倍力金瘡槐解毒溫中下氣煩滿短氣傷

藏咳嗽止渴通經脈利血氣解百藥毒爲九土之精

安和七十二種石一千二百種草久服輕身延年一

名蜜甘一名美草一名蜜草一名露草生河西川谷

積沙山及上郡二月八月除日採根暴乾十日成醫名

別錄○太  
觀本草

甘草釋名蜜甘別錄蜜草別錄美草別錄露草別錄國老別錄集

解別錄曰甘草生河西川谷積沙山及上郡二月八

月除日采根暴乾十日成溫中下氣煩滿短氣傷臟

欬嗽止渴通經脈利血氣解百藥毒為九土之精安

和七十二種石一千二百種草名醫別錄  
本草綱目

藟大苦爾雅

隰有苓詩邶  
風



采苓采苓首陽之巔

詩唐風

苓大苦也濕有苓苓大苦

詩毛莒傳

皆云采此苓於首陽山之上信有苓矣然而今之采

者未必於此然而人必信之

詩鄭玄箋

釋草云藟大苦孫炎曰本草云藟今甘草是也蔓延生葉似荷青黃其莖亦有節節有枝相當或云藟似

地黄

爾雅正義

苓从艸令聲郎丁切

說文

藟大苦也从艸雷聲郎丁切

說文

甘草主生肌肉

淮南子

美丹甘草也

廣雅

藟大苦今甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節

有枝相當或云藟似地黃

爾雅郭註

陶隱居云河西上郡不復通市今出蜀漢中慈從汶

山諸夷中來赤皮斷理者之堅實者是抱罕草最佳

抱罕羗地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚

腸者被刀破不復好青州間亦有不如又有紫甘草

細而實乏時可用此草最爲衆藥之主經方少不用

者猶如香中有沉香也國老卽帝師之稱雖非君爲  
君所宗是以能安和草石而解諸毒也

神農本草陶  
弘景註○大

觀本  
草

弘景曰此草最爲衆藥之主經方少有不用者猶如  
香中有沈香也國老卽帝師之稱雖非君而爲君所  
宗是以能安和草石而解諸毒也集解陶弘景曰河  
西上郡今不復通市今出蜀漢中悉從汶山諸夷中  
來亦庚嶠理者之堅實者是抱罕草最佳抱罕乃西  
羌地名亦將火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者

被刃破不復好青州間有而不如又有紫甘草細而  
實乏時亦可用

神農本草陶弘景  
註○本草綱目

雷公云凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人每斤皆長  
三寸剉破作六七片使籠器中盛用酒浸蒸從已  
至午出暴乾細剉使一斤用酥七兩塗上炙酥盡爲  
度又先炮令內外赤黃用良

炮炙論  
大觀本草

雷斅曰凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人每用切長  
三寸擘作六七片入籠器中盛用酒浸蒸從已至午  
取出暴乾剉細用一法每斤用酥七兩塗炙酥盡爲

度又法先炮令內外赤黃用

炮炙論  
本草綱目

徐之才曰木苦參乾漆爲之使惡遠志反大戟芫花

甘遂海藻

藥對  
○本草綱目

甘草君忌猪肉諸藥衆中爲君治七十二種乳石毒

解一千二百般草木毒調和使諸藥有功故號國老

之名矣主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿補益五藏制

諸藥毒養腎氣內傷令人陰萎主婦人血癰腰痛虛

而多熱加而用之

藥性論  
○大觀本草

甄權曰諸藥中甘草爲君治七十二種乳石毒解一



千二百般草木毒調和衆藥有功故有國老之號又  
曰忌猪肉主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿補益五臟  
腎氣內傷令人陰不痿主婦人血澀腰痛凡虛而多

熱者加用之

藥性論  
本草綱目

甘草味甘平無毒主五藏六腑寒熱邪氣堅筋骨長  
肌肉倍力金瘡腫解毒溫中下氣煩滿短氣傷藏欬  
嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒爲九土之精安和  
七十二種石一千二百種草久服輕身延年一名蜜  
甘一名美草一名蜜草一名露草生河西川谷積沙

山及上郡二月八月除日採根暴乾十日成千金翼方

陰頭生瘡蜜炙甘草末頻頻塗之神效代指腫痛甘

草煎湯漬之牛馬肉毒甘草煮濃汁飲一二升或煎

酒服取吐或下如渴不可飲水飲之即死千金方本草綱目

葶力丁反即甘草葉似地黃詩朱荅小序

正義曰葶大苦釋草文毛詩孔穎達疏

葶葶力丁切大苦也即甘草葉似地黃○爾雅音義

葶葶音諦詩作葶力丁切經典釋文

阿末末一名安味大亦甘久微香之无毒五六月開

花七月熟實乎九月採根乎乾用大同類聚方

臣禹錫等謹按爾雅云藟大苦注今甘草也蔓延生

葉似荷青黃莖亦有節節有枝相當疏引詩唐風云

采芩采芩首陽之巔是也蜀本草掌禹錫按○大觀本草

藟大苦也從艸露聲臣錯按本草即藥甘草也連丁

反徐謨說文解字通釋

甘草一名蜜甘一名美草一名密草一名藟仁路抱

罕草仁諸上音浮下音漢抱罕羌地名地也鱧魚腸者不好紫甘草時

種可用已上三一名大苦一名藟音零已上和名阿朮出兼名苑

歧 出陸奧國

和本名草

常陸國甘草廿五斤○陸奧國甘草十斤○出羽國

甘草五斤

延喜式

甘草 本草云甘草一名蜜草和名阿萬木

和名類聚抄

日華子云安魂安魄補五勞七傷一切虛損驚悸煩

悶健忘通九竅利百脉益精養氣壯筋骨解冷熱入

藥灸用

日華本草  
大觀本草

安魂定魄補五勞七傷一切虛損驚悸煩悶健忘通

九竅利百脉益精養氣壯筋骨

日華子大明  
本草綱目

圖經曰甘草河西川谷積沙山及上郡今陝西河東州郡皆有之春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角子如畢豆根長者三四尺麤細不定皮赤上有橫梁梁下皆細根也二月八月除日採根暴乾十日成去蘆頭及赤皮今云陰乾用今甘草有數種以堅實斷理者爲佳其輕虛縱理及細軟者不堪惟貨湯家用之謹按爾雅云藟大苦釋曰藟一名大苦郭璞云甘草也蔓延生葉似荷青黃莖亦有節節有枝相當或云藟似地黃詩唐風云采苓



采苓首陽之巔是也蓋與苓通用首陽之山在河東  
蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先儒所說苗葉與  
今全別豈種類有不同者乎張仲景傷寒論有一物  
甘草湯甘草附子甘草乾薑甘草瀉心等湯諸方用  
之最多又能解百毒爲衆藥之要孫思邈論云有人  
中烏頭巴豆毒甘草入腹卽定方稱大豆解百藥毒  
嘗試之不效乃加甘草爲甘豆湯其驗更速又備急  
方云席辦刺史嘗言嶺南俚人解毒藥並是常用物  
畏人得其法乃言三百頭牛藥或言三百兩銀藥辦

久住彼與之親狎乃得其實凡欲食先取甘草一寸  
炙熟嚙咽汁若中毒隨卽吐出乃用都樸藤黃藤二  
物酒煎令溫常服毒隨大小搜出都樸藤者出嶺南  
高三尺餘甚細長所謂三百兩銀藥也又常帶甘草  
半數寸隨身以備緩急若經含甘草而食物不吐者  
非毒也崔元亮海上方治發背秘法李北海云此方  
神授極奇秘以甘草三大兩生搗別篩末大麥麪九  
兩於一大盤中相和攪令勻取上好酥少許別搥入  
藥中勻百沸水浸如餅劑方圓大於瘡一分熱傅腫

上以油片及故紙隔令通風冷則換之已成膿水自  
出未成腫便內消當患腫著藥時常須喫黃耆粥甚  
妙又一法甘草一大兩微炙搗碎水一大升浸之器  
上橫一小刀子置露中經宿平明以物攪令沫出吹  
沫服之但是瘡腫發背皆可服甚效

圖經○大  
觀本草

蘇頌曰今陝西河東州郡皆有之春生青苗高一二  
尺葉如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角子如畢  
豆根長者三四尺粗細不定皮赤色上有橫梁梁下  
皆細根也采得去蘆頭及赤皮陰乾用今甘草有數

種以堅實斷理者爲佳其輕虛縱理及細軟者不堪

惟貨湯家用之謹按爾雅云藟大苦郭璞云甘草也

又詩唐風云采芣采芣首陽之巔是也藟與芣通用

首陽之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而

先儒所說苗葉與今全別豈種類有不同乎按孫思

邈千金方論云甘草解百藥毒如湯沃雪有中烏頭

巴豆毒甘草入腹卽定驗如反掌方稱大豆汁解百

藥毒予每試之不效加入甘草爲甘豆湯其驗乃奇

也又葛洪肘後備急方云席辯刺史嘗言嶺南俚人

解蠱毒藥並是常用之物畏人得其法乃言三百頭  
牛藥或言三百兩銀久與親狎乃得其詳凡飲食時  
先取炙熟甘草一寸嚼之嚙汁若中毒隨卽吐出仍  
以炙甘草三兩生薑四兩水六升煮二升日三服或  
用都淋藤黃藤二物酒煎溫常服則毒隨大小洩出  
又常帶甘草數寸隨身備急若經含甘草而食物不  
化者非毒物也三百頭牛藥卽土常山也三百兩銀  
兒鈴藤也詳見各條崔元亮海上集驗方云  
乃神授極奇秘用甘草三大兩生搗



腫又老瘡新尤兩和勻取好酥少許入內下沸水搜  
如餅樣方圓大於瘡一分熱傅腫上以細片及故紙  
隔令通風冷則換之已成者膿水自出未成者腫便  
內消仍當喫黃芪粥爲妙○又一方甘草一大兩微  
炙搗碎水一大升浸之器上橫一小刀子露一宿平  
明以物攪令沫出者沫服之但是瘡腫發背皆甚效

蘇頌圖經○  
本草綱目

甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙澁似  
有白毛實作角生如相思角作一本生于如小扁豆

齒啣不破今出河東西界入藥頂微炙不爾亦微涼

生則味不佳

本草衍義○丹波元胤訂正重雅宋本

衍義曰甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而粗澁似有白色實作角生如相思角作一本生子如小扁豆齒匕不破今出河東西界入藥雖微炙不尔亦微涼生則味不加

本草衍義○大觀本草

寇宗奭曰生則微涼味不佳炙則溫

本草衍義○本草綱目

蕭大苦大苦藥草也蕭一名大苦郭云今甘草也

爾雅

邢昺疏

爾雅曰藟大苦今之甘草是也本草云一名國老解  
百藥毒安和七十二種石一千二百種草故號國老  
之名國老者賓師之稱蓋藥有一君二臣三佐四使  
苓者又其賓師也故藥罕不用者雖非其君而君實  
宗焉蔓生葉狀似荷少黃莖亦有節節間有枝相當  
喜生下澤詩曰隰有苓是也晉風曰采苓采苓首陽  
之巔采苦采苦首陽之下采葑采葑首陽之東苓甘  
者苦苦者言讒人無所不至其害人也必因其似而  
譖焉采苓則因人之所甘而譖之之況也采苦則因

人之所苦而譖之之況也。釣則有時而甘亦有時焉。而苦采釣則又因人之所甘所苦而併譖之之況也。一章曰人之爲言苟亦無信。舍旃舍旃。苟亦無然。人之爲言胡得焉。二章曰苟亦無與。三章曰苟亦無從。者此言獻公好聽讒而主讒者之詞也。蓋苓生於隰。釣生於圃。則首陽之巔不必有苓。其下也不必有苦。其東也不必有釣。則理可以無信矣。然而獻公乃以謂之人也。爲此首陽采苓采苦采釣之言。苟亦無信。令我舍此采苓采苦采釣之人。苟亦無然。無與無從。

則人之爲此言也安從而得之哉凡此則以好聽故也故序曰好聽讒焉

埤

藟大苦今之甘草味甘而無毒○此草蔓生葉似荷青黃莖亦有節節有枝相當然不惟葉似荷古之蓮字亦通於藟故龜策列傳稱龜千歲乃遊蓮葉之上徐廣曰蓮一作苓聲相近借字也將以龜老而神故形小而陸游以爲奇若水中之蓮凡龜皆可游不足言矣又詩采苓以首陽之巔叶之豈藟亦蓮音邪藟甘而名大苦者猶牽牛有三黑點也而名爲三白



點此蓋秦俗所沿見禮記或素或青爾雅

甘草曰路草曰蜜甘曰美草或曰大苦即此也凡草

屬惟甘草爲國老大黃爲將軍不言君臣佐使也昆蟲

州木略

苓一名大苦葉似地黃卽今甘草也詩經朱熹集傳

本草注引爾雅云藟大苦注甘草也蔓延生葉似荷

青莖赤此乃黃蘗也其味極苦謂之大苦非甘草也

甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙澀似

有白毛實作角生如相思角作一本生熟則角拆子

如小扁豆極堅齒不破

夢溪筆談

珍云養血補胃梢子去胃中之痛胃中積熱非梢子

不能除

預元素珍味藥  
○湯液本草

稍主治生用治胸中積熱去望中痛加酒煮玄胡索

苦棟子尤妙

預元素  
本草綱目

甘草氣平味甘生用大瀉熱火炙之則溫能補上焦

中焦下焦元氣和諸藥相協而不爭性緩善解諸急

故名國老去皮用甘草梢子生用爲君去葷中痛或

加苦棟酒煮玄胡索爲主尤妙心云熱藥用之緩其

熱寒藥用之緩其寒經曰甘以緩之陽不足補之以  
甘中滿禁用寒熱皆用調和藥性使不相悖灸之散  
表寒除邪熱去咽痛除熱緩正氣緩陰血潤肺

李東垣藥

類法象○  
湯液本草

平性甘草

君惡遠志犯大戟羌花甘遂海藻用宜去皮服此忌猪肉及菰菜

味甘平

無毒生之則寒炙之則溫生則分身梢而瀉火灸則  
健脾胃而和中解百毒而有効協諸藥而無爭以其

甘能緩急故有國老之稱溫中解毒性平和無如國

老

即甘

○甘草味甘平無毒主解百毒為衆藥之王

故號國老及大戟羌活甘遂海藻

李杲藥性賦

三〇

〔主治〕生用瀉火熱熟用散表寒去咽痛除邪熱緩正氣養陰血補脾胃潤肺〔發明〕杲曰甘草氣薄味厚可升可降陰中陽也陽不足者補之以甘甘溫能除大熱故生用則氣平補脾胃不足而大瀉心火灸之則氣溫補三焦元氣而散表寒除邪熱去咽痛緩正氣養陰血凡心火衆脾腹中急痛腹皮急縮者宜倍用之其性能緩急而又協和諸藥使之不爭故熱藥得之緩其熱寒藥得之緩其寒寒熱相雜者用之得其

平

李杲○本草綱目

頭〔主治〕生用能行足厥陰陽明二經汚濁之血消腫

導毒〔發明〕震亨曰甘草味甘大緩諸火黃中通理厚

德載物之君子也欲達下焦須用稍子

朱震亨○本草綱目

甘草氣平味甘陽也無毒入足厥陰經太陰經少陰

經或問附子理中調胃承氣皆用甘草者如何是調

和之意答曰附子理中用甘草恐其僭上也調胃承

氣用甘草恐其速下也二藥用之非和也皆緩也小

柴胡有柴胡黃芩之寒人參半夏之溫其中用甘草



者則有調和之意中不滿而用甘爲之補中滿者用  
甘爲之泄此升降浮沈也鳳髓丹之甘緩腎濕而生  
元氣亦甘補之意也經云以甘補之以甘瀉之以甘緩  
之本草謂安和七十二種石一千二百種草名爲國  
老雖非君而爲君所宗所以能安和草石而解諸毒  
也於此可見調和之意夫五味之用苦直行而泄辛  
橫行而散酸束而收斂鹹止而軟堅甘上行而發如  
何本草言下氣蓋甘之味有升降浮沉可上可下可  
內可外有和有緩有補有泄居中之道盡矣入足厥

陰太陰少陰能治肺痿之膿血而作吐衄能消  
之瘡疽每用水三椀慢火熬至半椀去粗服之消瘡  
與黃芪同功黃芪亦能消諸腫毒癰疽修治之法與

甘草同

湯液  
水

**氣味**至好古曰氣薄味厚升而浮也入足太陰厥陰  
**主治**吐肺痿之膿血消五發之瘡疽發明好古曰  
五味之用苦泄辛散酸收鹹斂甘上行而發而本草  
言平氣何也蓋甘味主中有升降浮沈可上可下可  
外可內有知有緩有補有泄居中之道盡矣張仲景

附子理中湯用甘草恐其僭上也調胃承氣湯用甘草恐其速下也皆緩之之意小柴胡湯有柴胡黃芩之寒人參半夏之溫而用甘草者則有調和之意建中湯用甘草以補中而緩脾急也鳳髓丹用甘草以緩腎急而生元氣也乃甘補之意又曰甘者令人中滿中滿者勿食甘甘緩而雍氣非中滿所宜也凡不滿而用炙甘草爲之補若中滿而用生甘草爲之瀉能引諸藥直至滿所甘味入脾歸其所喜此升降浮沉之理也經云以甘補之以甘瀉之以甘緩之是矣

玉好古○  
本草綱目

西土甘草大者如柱土人以架屋唐遇士西遊親見

之罪雪  
錄

甘草味甘氣平生寒炙溫可升可降陰中陽也無毒  
產陝西川谷逢秋後採根因味甘甜故名甘草忌豬  
肉惡遠志反甘遂海藻及大戟芫花入太陰少陰厥  
陰足經用白水乾漆苦參引使生渴火炙溫中稍去  
麝管並麻節消癰疽燉腫子除胃熱三者宜生身選  
壯大橫紋刮皮生炙隨用應癰單服即散

凡毒生陰  
囊後肛門



前謂之懸癰以火熨之咽痛旋然能除同桔梗治肺  
者五錢酒煎服下即散

癰膿血齊來同生薑止下痢赤白雜至小兒初生如  
黃連煎湯拭口有益飲饌中毒伴黑豆煮汁恣飲無

虞中砒毒者曾昇此方救活百人卻臍腹急疼毆臟腑邪熱堅筋骨

長肌肉健脾胃補三焦止渴除煩養血下氣解百藥  
毒免害和諸藥性杜爭後人尊之稱為國老又因性  
緩能解諸急故熱藥用之緩其熱寒藥用之緩其寒  
如附子理中用者恐僭諸上調胃承氣用者恐速于  
下是皆緩之非謂和也小柴胡湯有柴胡黃芩之寒



人參半夏之溫內加同煎此却調和相協非謂緩焉  
鳳髓丹中又為補劑雖緩腎濕實益元陽經云以甘  
補之以甘緩之以甘瀉之悉可徵矣中滿證恐甘能  
作脹切禁莫加下焦藥因性緩難達務宜少用凡諸  
嘔吐亦忌煎嘗久服輕身延年耐老錄按五味之用  
苦直行而瀉辛橫行而散甘上行而發酸束而收斂  
鹹止而軟堅甘草味之極甘當云上發可也本草反  
言下氣何耶蓋甘味有升降浮沉可上可下可內可  
外有和有緩有補有瀉居中之道其盡故爾

本草  
蒙筌

甘草味甘性平無毒入心脾二經生則分身稍而瀉  
 火炙則健脾胃而味中解百毒和諸藥甘能緩急等  
 稱國老白芷乾漆苦參爲使惡遠志反甘遂海藻大  
 戟芫花忌豬肉梅菜 按味甘入脾爲九土之精安  
 和七十二種金石一千二百種草木有調攝之功故  
 名國老然性緩不可多用一匙甘能作脹一匙藥餌  
 無功惟虛人多熟及諸瘡毒者宜倍用中滿及初痢  
 者忌之所謂脾病人毋多食甘也 雷公云凡使須  
去頭尾  
尖處其頭尾吐人每斤著長三寸剉破作六七片  
使甕器中盛用酒浸蒸從已至午出曝乾細剉使一

斤用酖七兩塗上炙酖盡為度先炮令內外赤黃用良製藥性鮮

辟穀方

見曜仙神隱

生服松柏葉用茯苓骨碎補杏仁廿

草搗末取生葉蘸水滾與葉末同食

又方

見山居四安

杜仲茯苓甘草荆苁等分為末糊丸如桐子大每服

數丸即吃草木可以充飢止有竹葉甘草不可同食

食草葉有毒惟鹽可解同

休糧方

見仙娥

礞砂仁

貫眾白芷茯苓甘草右為細末煮黑豆熟以藥拌置

鍋用黃蠟一兩薄切揅豆上令勻取豆焦乾為度以

數粒同松釵中節食亦可不飢

大道丸

見尊生黑

送一升去皮貫仲甘草各一兩白茯苓菰朮礞砂仁  
各五錢右五味剉碎用水五升同豆熬煎火須文武  
緊慢得中宜至水盡揀去藥取豆搗如泥作雞頭子  
太入有益磁瓶密封每嚼一丸可食百般苗葉終日  
恣飽雖異草殊水素所不識者覺甘甜與進飯同

休糧養道方

見救荒本草

白麴六斤香油三斤白蜜三斤

乾姜二兩滾水泡生薑四兩去皮甘草二兩白茯苓  
四兩黃米三升右爲細末和成一塊切作片蒸一時  
陰乾爲末先吃飽飯後服此藥一茶匙淨水送下若



服至一盞可一月不飢要解藥力藥末煎湯服之仍

舊食飯

政富  
全書

李時珍曰按沈括筆談云本草註引爾雅蔓大苦之  
註爲甘草者非矣郭璞之註乃黃蘗也其味極苦故  
謂之太苦非甘草也甘草枝葉悉如槐高五六尺但  
葉端微尖而體濇似有白毛結角如相思角作一本  
生至熟時角折子扁如小豆極堅齒嚙不破今出河  
東西界寇氏衍義亦取此說而不言大苦非甘草也  
以理度之郭說形狀雖不相類沈說近之今人惟以



大徑寸而結緊斷紋者爲佳謂之粉草其輕虛細小者皆不及之鑄續羅雪錄言安南甘草大者如柱土人以探屋不識果然否也條治時珍曰方書炙甘草皆用長流水蘸濕炙之至熟刮去赤皮或用漿水炙熟未有酥炙酒蒸者大底補中宜炙用瀉火宜生用氣味時珍曰甘草與藻戟蓬朮四物相反而胡洽居士治痰癖以十棗湯加甘草大黃乃是痰在膈上欲今通泄以拔去病根也東垣李杲治項下結核消腫潰堅湯加海藻丹溪朱震亨治勞瘵蓮心飲用芫花

二方俱有甘草皆本胡居士之意也故陶弘景言古  
方亦有相惡相反並乃不爲害非妙達精微者不能  
知此理[主治]解小兒胎毒驚癇降火止痛主癰腫宜  
入吐藥[發明]時珍曰甘草外赤中黃色兼坤離味濃  
氣薄資金土德協和羣品有元老之功普治百邪得  
王道之化贊帝力而人不知歛神功而已不與可謂  
藥中之良相也然中滿嘔吐酒客之病不喜其甘而  
太鹹芫花甘遂海藻與之相反是亦迂緩不可以救  
昏昧而君子嘗見嫉於宵人之意與

本草綱目

味甘 平無毒生用性寒炙用性溫通入手

足十三經 藥性曰生於西河東州郡及汶山諸夷處

微尖而銳 編有白毛七月開紫花結莢至熟時莢

拆子圓如小畢豆極堅齒嚼不破根長三四尺粗細

不定皮赤色上有橫梁深下皆細根也此物有數種

以堅實斷理者為佳其輕虛縱理及細軟者不堪用

又蜀漢中及汶山諸夷中來者其皮亦斷理堅實者

是抱罕最佳抱罕乃西羌地名凡使用者去頭尾及

赤皮 炙用 甘草和中益氣補虛解毒之藥也健脾胃固

中氣之虛羸協陰陽和不調之營衛故治勞損內傷

脾虛氣弱元陽不足肺氣衰虛其甘溫平補効與參

耆並也又如咽喉腫痛佐枳桔鼠粘可以清肺開咽

痰涎咳嗽無蘇子二陳可以消痰順氣佐黃耆防風  
能運毒走表爲痘疹氣血兩虛者首尾必資之劑得  
黃芩白芍藥止下痢腹痛得金銀花紫花地丁消一  
切疔毒得川黃連解胎毒于有生之初得連翹散懸  
癰于無成之際凡用純熱純寒之藥必用甘草以緩  
其勢如附子理中湯用甘草恐其僭上調胃承氣湯  
用甘草恐其速下此是緩之之法也寒熱相雜之藥  
必用甘草以和其性如小柴胡湯有柴胡黃芩之寒  
人參半夏之溫內用甘草此是和之之意也又建中



湯用甘草以緩脾急而補中州也鳳髓丹用甘草以  
緩腎急而生元氣也協和羣品有元老之功普治百  
病得王道之化經云以甘緩之是也陳延壽先生  
曰五味之用苦直行而瀉辛橫行而散甘上行而發  
酸束而收斂鹹止而軟堅甘草味之極甘當云上發  
可也本草又言下氣何耶蓋甘味有升降浮沉可上  
可下可內可外有和有緩有補有瀉居中之道具盡  
故爾高元陽先生曰實滿忌甘草固矣若中虛五  
陽不布以致氣逆不下滯而爲滿服甘草七劑卽通



繆仲淳先生曰本草謂甘草爲九土之精安和七  
十二種石一千二百種草又能止渴通經脈解百物  
毒甘爲脾藥甘能入脾生血故止渴血虛則經脈不  
通能生血則經脈自通矣其解一切金石草木蟲魚  
禽獸之毒者凡毒遇土則化甘草爲九土之精故能  
解諸毒也○甘能緩中中滿者忌之嘔家忌甘酒家  
亦忌甘諸濕腫滿及黃疸臃脹鬱結諸證禁用 朱  
東生先生曰甘草生瀉火炙補中用稍去尿管澀痛  
又利小便用節消癰疽腫毒又能護膜生肌○集方

治脾胃不和一切勞損內傷諸不足證用甘草三錢  
人參三錢黃耆白朮各五錢當歸身七錢生薑五片  
黑棗十枚水煎服○治傷寒心悸脉結代者用甘草  
一兩水煎服○治傷寒咽痛少陰證用甘草五錢水  
煎服○治赤白下痢用甘草一錢川黃連一錢五分  
水煎服○治舌腫塞口不治殺人用甘草一兩水煎  
濃湯兼煎漱白頻吐漸消○治一切癰疽諸發預先  
服之能消腫逐毒用大甘草五觔湖水一石煎至五  
斗入磁砂鍋內慢火熬成膏以磁瓶收貯每服十茶

匙白湯下凡病丹石烟火毒發亦解之或微利無妨  
○治諸般癰毒初起用甘草一兩水煎服令人以毒  
處口嘔之○治瘡癰頻渴用甘草五錢水煎頻頻與  
之如內熱加黃連花粉各一錢內虛加人參黃耆各  
一錢○治陰下懸癰生于陰囊穀道前初發如松子  
漸大如蓮子後亦腫如桃李成膿卽破破後難愈用  
大甘草二兩炙黃連再用漢流淡水五碗煎一碗食  
前服如未潰可消已潰可斂半月全愈○治蠱毒藥  
毒用甘草節數寸以真麻油浸之年久愈妙每用少

許噉噉或水煎服亦妙○治小兒中蠱欲死者用甘草五錢水煎服卽吐出○治積勞虛損氣血俱虧用甘草人參白朮茯苓陳皮黃耆當歸白芍藥遠志肉桂各一錢北五味七分熟地黃三錢肉桂八分黑棗二個生薑二片水煎服○治中氣虛乏脾元不足飲食減少精神疲倦用甘草炙六分人參白朮茯苓各二錢加黑棗三個生薑二片水煎服○治中氣虛脾胃弱虛疲虛嗽氣逆不寧用前方加半夏陳皮各一錢加桑螵蛸煎服○倪朱謨曰甘草爲藥中國老諸方



配用極多今隨手聊選數方不足以盡其用凡草木金石禽獸蟲魚諸部集方中配用不少如臨證擇方

自見

本草

甘草

志及大乾 味甘平無毒主五臟六腑寒熱

生汾者佳入藥用根

國味

甘遂名甘草

味甘平無毒主五臟六腑寒熱

腫解

毒溫中下氣頗滿短氣傷臟欬嗽止渴通經脈

利血

氣鮮百藥毒為尤七之精安和七十二種石一

个二

百種草故於人譬之國老不入君臣佐使之列

雖非

君而為君所宗以其能變和故也皮紅肉黃

有長

短粗細不同生瀉火炙溫中稍去尿

管注

痰節消瘰癧瘰癧腫身刮皮生炙隨用

大小令以大為粉草而泥于小者不用不知非粉草

甘草

甘草

三十五

五一



通汾草也選壯大如土樣者宜用雷公云凡使頭

尖處其頭尾吐人每斤皆長三寸判劈破作六七片使甕器中盛用酒浸蒸從已至午出曝乾細判使一

斤用酥七兩塗上炙酥盡為本

草原始

甘草又名大苦名藟詩山有榛隰有藟便覽

甘草味甘氣平性溫可升可降陽中陽也他書說陰

中陽者誤無毒反甘遂不可同用同用必至殺人入

太陰少陰厥陰之經能調和攻補之藥消癰疽癰毒

實有神功尤善止諸痛除陰虛火熱止渴生津但其

性又緩凡急病最宜用之故寒用熱藥必加甘草以

制桂附之熱熱病用寒藥必加甘草以制石膏之寒  
下病不宜速攻必加甘草以制大黃之峻上病不宜  
遽升必加甘草以制施子之動緩之中具和之義耳  
獨其味甚甘甘則善動吐嘔家不宜多服要亦不可  
拘也甘藥可升可降用之吐則吐用之下則下顧善  
用之何如耳或問甘草乃和中之藥攻補俱用不  
識亦有不宜否夫甘草國老也其味甘甘宜于脾胃  
然脾胃過受其甘則寬緩之旺生水穀入之必不迅  
于傳導而或至于停積痰滯夫水穀宜速化者之宜

速化而不速化則傳于各臟腑未免少失其精華而各臟腑因之而不受其益者有之世人皆謂甘草有益而無損誰知其益多而損亦有之知乎知其益而防其損斯可矣或疑甘草在藥中不過調和無大關係此論輕見甘草矣甘草實可重用以收功而又能調劑以取效益藥中不可缺之藥非可有可無之品也或問細節甘草其性少寒可瀉陰火不識陰虛火動之症亦可多用之乎吾謂甘草乃瀉火之品原不在細小也細小瀉火豈粗大者反助火乎惟是甘

華瀉火用之于急症者可以多用用之于緩症者難以重加蓋緩症多是虛症虛則胃氣必弱而甘草性過乎甘多用難以分消未免有飽脹之虞不若少少用之則甘溫自能退火熱且若陰虛之症正胃弱也如何可多用乎毋論粗大者宜少用卽細小者亦不可多用也 或問中滿症忌甘恐甘草助人之脹乎不知中滿忌甘非忌甘草也中滿乃氣虛中滿氣虛者脾胃之氣虛也脾胃喜甘安在反忌甘草因甘草性緩緩則入于胃而不卽入于脾胃氣旣虛得甘草

之補不能遽然承受轉若添其脹滿者亦一時之脹  
而非經久之脹也故中滿之症反宜用甘草引人參  
茯苓白朮之藥入于中滿之中使脾胃之虛者不虛  
而後脹者不脹但不可多用與專用耳蓋多用則增

滿而少用則消滿也專用則添脹而同用則除脹也

誰謂中滿忌甘草哉

李巖評云中滿忌甘草反用之以成功可見藥宜善用何獨一

甘草

或問甘草乃解毒之聖藥古人盛稱而吾子約

言豈甘草不可以解毒也嗟乎甘草解毒無人不知  
然盡人皆知解毒而盡人不知用之也愚謂甘草解



毒當分上中下三法上法治上焦之毒宜引而吐之  
中法治中焦之毒宜和而解之下法治下焦之毒宜  
逐而瀉之吐之奈何用甘草一兩加瓜蒂三枚水煎  
服凡有毒一吐而愈和之奈何用甘草一兩五錢加  
柴胡三錢白芍三錢白朮子三錢當歸三錢陳皮一  
錢水煎服毒自然和解矣瀉之奈何用甘草二兩加  
大黃三錢當歸五錢桃仁十四粒紅花一錢水煎服  
毒盡從大便出矣此三者雖不敢謂解毒之法盡乎  
此然大約亦不能出乎此毋論服毒中毒與初起瘡

毒皆可以三法治之此用甘草解毒之法人亦可以

聞吾言而善用乎李巖評云甘草解毒分上中下

三法實確而妙

本編

甘草 國老 蜜草 蜜甘 偷蜜珊瑚 大嗽

美草

越草

事物異名

甘草 ○存中辨景純藹大苦非甘草是也今重秦粉

艸正以西遼風勁其根直深故其力厚劉客生言西

寧鎮番甘草最多葉似天竹但冬凋耳根鬚直下數

丈外域成樹

物理小識

千金方蜜二斤白麴六斤香油二斤茯苓四兩甘草  
二兩生薑四兩去皮乾薑二兩炮爲末拌勻搗爲塊  
子蒸熟陰乾爲末絹袋盛每服一匙冷水調下可待  
百日玄扈先生曰未必然 生服松栢葉法用茯苓  
骨碎補杏仁甘草搗羅爲末取生葉蘸水滾藥末同  
食香美 食草水葉法用杜仲醋炒茯苓甘草荆  
林等分爲末糊丸如桐子大每服數丸細嚼卽喫草  
水可以充飢止有竹葉惡草不可食嘗見苦行僧人  
入山耽靜必炒塩入竹筒燒柱云食草葉有毒惟塩

可解玄扈先生曰或云先食碧苔草則草木葉皆可

食散政全書

苔詩濕有苔苔一名大苔葉似地黃即今甘草也潛確

著居類

山西布政司文原府甘草○汾州甘草○沁州甘草

大明統志

甘草味甘生用氣平補脾胃不足而渴心火火急甚者必以

此繳灸用氣溫補三焦元氣而散表寒入和劑則補

益入汗劑則解肌解退肌表之熱入涼劑則渴邪熱白虎湯

之入峻劑則緩止氣蔓附如之恐其後下皆緩之之意入

潤劑則養陰血湯之類能協和諸藥使之不爭生肌

止痛土生肌肉通行十二經解百藥毒凡解毒藥並

不効小兒初生拭去口中惡故有國老之稱中滿症

忌之甘令人滿亦有生用為瀉者以其能引諸藥至

顯並云除滿脾健運則滿除也仲景治痞滿有甘

大而結者良補中炙用瀉火生用達莖中用稍止

莖中痛淋白术苦參乾漆為使惡遠志反大戟芫花

甘遂海藻然亦有並用者胡洽治痰癰十棗湯加甘

甘草草東垣治結核與海藻同

甘草

三十三

六一



用丹溪治勞瘵蓮心飲與芫花同行非妙達精微者  
不知此理十棗湯芫花甘遂大戟等分棗十枚仲景  
治傷寒表已解心下有水氣喘咳之劑時珍曰甘草  
外赤中黃色兼坤離味濃氣薄資全土德協和群品  
有元乾之功普治百邪得王道之化贊帝力而人不  
知參神功而已不可謂藥中之良相也昂按甘草  
之功用如是故仲景有甘草湯甘草甘芍藥湯甘草  
湯炙甘草湯以及桂枝麻黃葛根青龍理中四逆  
調胃建中柴胡白虎等湯無不重用甘草贊助成功  
即如後人益氣補中瀉火解毒諸劑皆倚甘草為君  
必須重用方能建功此古法也奈何時師每用甘草  
不過二三分而止不知始自何人相習成風牢不可  
破殊屬可笑附  
○有補有瀉能表能裏可外可降○

陶弘景註明醫別錄發明藥性本草  
備要

苓離呈切音陵詩邛風隰有苓又唐風采苓采苓○

臨離星切音陵藥草也筆談曰爾雅藟大苦郭註甘  
草蔓生葉似荷青黃莖亦有節節有枝相當或云藟  
似地黃不知此非甘草乃黃藥也味極苦故謂之大  
苦又開寶本草曰黃藥子一曰紅藥以根赤色乾則  
黃也李時珍曰四川苦藥子卽黃藥子一名地不容  
解一切毒說文藟大苦甘甘草分爲二部郭註以大  
苦爲甘草藥後儒註爾雅藟苦藟引郭說爲證謂藟  
味甘而言苦者古人語倒猶甘草而謂之大苦此又  
泥郭註而誤者也舊本載昭武黃氏說亦誤又與苓

通 蓼離呈切音零通作苓亦作藟音義同說文苓  
卷耳藟大苦分爲二 昔俗甘字甘艸枝葉如槐高  
五六尺葉端微尖有白毛實作角角熟則角折子如  
小扁豆至堅出蜀漢羌地者良一名美草一名國老  
甄權曰諸藥中甘草爲君治七十二種乳石毒解一  
千二百種草毒調和衆藥有功故有國老之號爾  
雅藟大苦郭註誤云甘草本草引郭說太苦乃黃藥  
子一名赤藥一名紅藥子味苦故名大苦沈括筆談  
辨之甚明通史物性志泥爾雅註謂甘草名大苦猶

牽牛有三黑點名三白尤非又解毒子亦名苦藥子  
與黃藥相類唐本草名地不容今皆謂黃藥紅藥以  
甘草根赤色乾則變黃故有是名併指地不容爲甘  
草皆相承而譌又茶亦名甘草清異錄謂陸羽爲甘  
艸癖藤亦名甘草出潮陽及南漳資暇錄謂叢似薔  
薇葉似夜合花淺紫色莖黃枝葉俱甜此又異類同  
名也○味甘故名甘草俗加甘與通草作蓮牛膝作  
竿藤誤同

正字  
通

藟 大苦 爾雅藟大苦疏藥草也藟一名大苦今

甘草也又豉亦名大苦 美丹 美草 博雅美丹

甘草也又名醫別錄作美草 靈通 記事畧甘草

一名靈通 國老 藥性本草諸藥中甘草爲君調

和衆藥有功故有國老之號 蜜甘 蜜草 露草

本草綱目甘草一名蜜甘一名蜜草一名露草

偷蜜珊瑚 清異錄侯寧極藥譜偷蜜珊瑚甘草也

事物異  
名錄

替古三切音甘替草○按甘草其味甘故名復加艸

非義矣 葶離呈切音陵與藟同 藟郎下切音陵



說文大苦也葉似地黄卽今甘草昭武黃氏曰甘而  
言苦者古人語倒詩作苓隰有苓字

苓毛傳苓大苦正義曰釋草云藟大苦孫炎曰本草  
云藟今甘草是也蔓延生葉似荷青黃其莖赤有節  
節有枝相當或云藟似地黄圖經甘草河西川谷積  
沙山及上郡今陝西河東州郡皆有之春生青苗高  
一二尺葉如槐葉七月開紫花冬結實作角子如畢  
豆詩采苓首陽首陽山在河東蒲坂縣今甘草所生  
處相近而先儒說苗葉與今全別豈種類有不同者

乎愚按爾雅毛傳皆謂大苦疑是味苦者故沈括以大苦爲黃蘗然本草諸說並皆指甘草朱子集傳亦從之蓋古人語倒謬甘草而云大苦猶之莖葵味甘而釋草乃謂之苦莖也

毛詩名物圖說

甘草

甘古作皆

一名國老一名靈通一名美草一名蜜草

一名蜜甘一名落草生陝西河東州郡青州間亦有之春生青苗高三四尺枝葉悉如槐葉端微尖而糙漚似有白毛七月開紫花冬結實作角子熟時角拆子扁如小豆極堅根長者三四尺麤細不定皮赤上

有橫梁梁下皆細根採得去蘆頭及赤皮陰乾用以  
堅實斷理者爲佳謂之粉草其輕虛縱理及細韌者  
不堪用味甘平無毒最爲衆藥之主治七十二種乳  
石毒解一千二百般草木毒調和衆藥故有國老之  
號生用瀉火熱熟用散表寒其性能緩能急而又協  
和諸藥使之不爭惟中滿嘔吐嗜酒者忌用昔有中  
烏頭巴豆毒者甘草入腹卽定加大豆其驗奇應嶺  
南解蠱毒凡飲食先取炙甘草一寸嚼之嚙汁若中  
毒隨吐出仍以炙甘草三兩生薑四兩水六升煮二

升日三服常帶數寸隨身備用若含甘草食物而不  
吐是無毒者也 頭生用能行足厥陰陽明二經汗  
濁之血消癰疽腫痛之毒宜入吐藥 梢生用治胸  
中積熱去莖中痛加酒煮玄胡索苦楝子尤佳 〔彙  
考〕增〔梁書〕宕昌國傳〔天監四年〕王梁彌博來獻甘草  
當歸詔以爲使持節都督河涼二州軍事安西將軍  
東羌校尉河梁二州刺史隴西公宕昌王 〔西陽雜  
俎〕秀才權同休元和中下第旅遊蘇湖間遇疾貧窘  
走使者本村野人僱已一年矣疾中思甘豆湯令其

市甘草僱者久而不去但具火湯水秀才且意其怠  
於祇承復見折樹枝盈握仍再三搓之微近火上忽  
成甘草良久取麤沙數掬接按已成豆矣及湯成與  
甘豆無異疾亦漸瘥 夢溪筆談本草注引爾雅云  
藹大苦注甘草也蔓延生葉似荷青莖赤此乃黃藥  
也其味極苦謂之大苦非甘草也甘草枝葉悉如槐  
高五六尺但葉端微尖而糙澀似有白毛實作角生  
如相思角非一本生熟則角拆子如小扁豆極堅齒  
嚙不破 〔霏雪錄〕西土甘草大者如柱土人以架屋



唐遇士西遊親見之〔集藤五言律詩〕增宋梅堯臣

司馬君實遺甘草杖美草將爲杖孤生馬嶺危難從  
荷藤叟寧入化龍陂去與秦人採來扶楚客寢藥中  
稱國老我懶豈能醫〔別錄原灸法〕長流水蘸濕灸

透爲熟刮去赤皮或用漿水有云用酒及酥灸者非

也

廣羣芳譜

清異錄二卷乃宋陶翰林院穀所撰凡天文地理君  
道官志人事女行君子么麼釋族仙宗草木花果蔬  
藥禽獸蟲魚支體作用居室衣服粧飾陳設器具文

用武器酒漿茗薺饌羞喪葬鬼妖皆創爲異名新說而藥譜一則尤奇甚因備錄之 必芻清本良於醫

藥數百品各以角貼所題名字詭異余大駭究其源底答曰天成中進士侯寧極戲造藥譜一卷盡出新意改立別名因時多艱不傳于世余以禮求假一通

用娛閒暇

偷蜜珊瑚

甘草

云云

輟耕錄

寧波府甘草四明山記四明山心有五朶峯南一巖有石穴通泉流於梨洲穴生甘草

浙江通志

甘草春生青苗旣熟味甜故名弘景曰此草最爲衆

藥之主經方少有不用者如香中有沉香也通鑑輔志

甘草和名阿末幾異名蜜甘別錄國老同美草同增補

異名蜜草別錄茲草同靈通記事多識編

甘草シラフ草葉鹽

苓 未詳 本草注引爾雅云藟大苦注甘草也蔓

延生葉似荷莖青赤此乃黃藥也其味極苦謂之大

苦非甘草也甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微

尖而糙澁似有白毛實作角生如相思角作一本生

熟則角拆子如小扁豆極堅齒齧不破宋沈存中夢溪筆談李

曰苓大苦也爾雅以爲甘草沈存中以爲非亦未可

知然

毛詩經  
集解小識

甘草稟土中中和之陽氣震亨曰大緩諸火黃中通  
理厚德載物之君子也東垣曰氣薄味厚可升可降  
陰中陽也陽不足者補之以甘甘溫能除大熱性能  
緩急而又協和諸藥使之不爭生用氣平而瀉心火  
炙之氣溫而散表寒時珍曰協和羣品有元老之功  
普治百邪得王道之化可謂藥中之良相也 同黃  
耆防風能運毒走表爲痘疹氣血兩虛者首尾必資

之劑 得白芍則補脾甲己化土也 同人參黃耆

白朮大棗當歸身麥冬加升麻柴胡爲補中益氣藥

專理飢飽勞役內傷陽氣下陷發熱 同人參乾薑

肉桂則溫 同麥冬蘇子枇杷葉則下氣 同黃連

芍藥升麻滑石解熱毒滯下 同桔梗元參牛蒡子

枯梅根清利咽喉虛熱 同人參菖蒲益智仁龍眼

肉遠志治健忘 同麥冬石膏竹葉知母除煩悶躁

渴頭疼解肌 同紫花地丁金銀花甘菊夏枯草益

母草貝母白及白芷消一切疔腫 同川黃連止小



兒胎毒驚癇 同黃連木通赤芍生地瀉心經有餘

之火 單用水炙百徧煎熬飭許治懸癰如神 炙

則補傷寒病瘥後血虛 甘能緩中中滿者忌之嘔

家酒家忌甘諸溼腫滿及脹滿病咸不宜服 本草經

甘草味甘平主五藏六府寒熱邪氣 甘能補中氣中

精皆能四布而驅 堅筋骨長肌肉倍力 形不足者補

之甘為土之正味而又 金瘡 脾主肌肉補脾則 解

毒 甘為味中之至正味正 久服輕身延年 補後天 此

以味為治也味之甘至甘草而極甘屬土故其效皆

在于脾脾爲後天之主五藏六府皆受氣焉脾氣盛

則五臟皆循環受益也

神農本草經百種錄

甘草味甘平主五藏六府寒熱邪氣堅筋骨長肌肉

倍力金創瘡解毒久服輕身延年

御覽引云一名美草一名蜜甘大觀

本作黑字

生川谷

○名醫曰一名蜜甘一名美草一名蜜

草一名路

當作

艸生河西積沙山及上郡二月八日

除日采根暴乾十日成

案說文云甘甘草也藹大

苦也苦大苦苓也廣雅云美草甘草也毛詩云隰有

苓傳云苓大苦爾雅云藹大苦郭璞云今甘草蔓延

生葉似荷青黃莖赤黃有節節有枝相當或云藟似  
地黃此作甘省字藟苓通

孫星衍神農本草經

甘草 莖毛葉毛莢ノコトシ根ハカヅラノ如シ

根則甘草也大ナルヲ良トス小ナルハ性薄シ昔

ハ日本ニアル事ヲシラス近世甲斐國ヨリ多ク

出ツ唐ヨリ來ル甘草トクラベシニ少モ不異性

ヨシト云奥州ニアリ鼠好テ食シテ根タヘヤス

シ子ヲウヘテ三年ノ後はヲトル其根如竹根繁

茂ス或云深山所々有之黃芪葉ニ似テコハシ

醫書ニ甘草ヲ用ル事與他藥等分ナリ中華ノ人  
稟性厚ク強シ故ニ肥甘ヲ好ミ多食シテ無害能  
峻補ヲ受ク飲饌ノ害ニ所載烹調ノ饌具ヲ見テ  
可知胃氣ヲヨク順リヤスケレハ也本邦ノ人ハ  
薄弱ナリ不能受峻補甘草ヲ多服スレハ寒氣中  
滿藥力停滯ス故ニ倭醫之用甘草他藥ノ十分一  
或五分一ヲ用ユ

大和本  
草

按甘草出於南京陝西河東山西者爲上皆稱之南  
京甘草出於福州者細脆帶微苦味又細而如絹者

俗謂之藁手又太者名粉草俗謂之鞭手 往昔日

本有甘草延喜式云陸奧出羽常陸每年貢之如今

絕不出雖希有而細硬不佳

倭漢三才圖會

甘草 和名 アマキ 廣雅ニ美丹輟耕錄ニ偷

蜜珊瑚ト云皆陰名也本ト本邦ニ無之近代南京

ノ種ヲ所々ニ裁工其葉藤ニ似テ至テ小ニシテ

少シク細白毛アリ復月花ヲ出ス花ノ形チ胡枝

子ノ花ニ似タリ少シ黃色ナリ子ハ一莖ニ二三

莢ヲ結フ沈括筆談ニ所説ノ如シ根ハ漢ヨリ載



本草綱目卷之八

本草花  
附繪

甘草

附

梢節

釋名

甘甜也其味尤甜故名之

修治去

粗皮剉用或炙或酒浸炙製法頗多當隨本方太而  
皮薄黃色堅實者佳細而堅實者次之輕虛黑色或  
蛀或朽者不可用萊肆稱堅鞭者尤良日本古有此  
草今亦當在只不知之耳延喜式二載不常陸陸奥  
出羽三國獻之氣味甘平無毒能入脾經白朮爲使  
補脾和中潤肺治痰止瀉退熱堅筋長肌除咽痛定  
咳逆解一切毒和一切藥生用瀉火熱藥用去裏寒

梢止莖中痛節主腫毒瘡毒惡瘰癧及大戟芫花甘  
遂海藻嘔病酒病服病俱禁之修治本書ノ如シ  
今茶肆ニ南京福州ノ二種アリ南京ヲ上トス能  
本書ヨシ甘草ノ功能諸本草ニイロク精シキヲ  
云テアレモ今日本デ用ルハ諸茶ヲ和スルマデ  
ノナリ故ハ一貼ノ内ヘ十分一ホド入レハ隨  
分ワヅカナリ甘草一分ノ功ハナイハズナリ此  
日本人ハ甘キヲ嫌フユヘニ方書ノ兩目ニ用レ  
ハメワタニ甘クナリテ難用ゾ其内ニ茶ノ甘キ

好ムモノアルモノナリサヤウナルニハ甘草ヲ

多ク入レテ瀉藥ナトモ用井ヨキモノナリ〔梢〕此

ハ甘草ノトボサキナリ淋病ノ藥ニ入ルベシ玉片

六八  
本草

苓 佩有苓邛崃 今章 米苓米苓唐風 米 朱註苓一名

大苦葉似地黄卽今甘草也爾雅藟大苦ト是ナリ

郭璞甘草ト注ス草木考等ノ書モ郭氏ニ從フ今

解苓者姑從フヘシ沈括夢溪筆談苓卽黃藥ニメ

甘草ニ非スト云ヘリ李時珍亦從沈括ニ解ス然

レ氏詩苓ノ苓ハ甘草トスヘキカ黃藥ノ味ヒ若  
キ西方美人ヲ興スレハ不倫ナリ朱傳大苦葉似  
地黃卽今甘草ト亦不深考甘草葉似槐而蔓延今  
諸州所出才ホシ金地黃葉ニ似ス葢葉似地黃ト  
ハ爾雅疏或說一種ノ苓ニメ甘草ヲ解スルニア  
ラス朱傳合メ爲一ハ非

詩經名  
物辨解

甘草 漢ヲ可用和邦ニモ甲斐ノ國ニ産<sub>レ</sub>之<sub>テ</sub>形<sub>々</sub>大  
ニシテ節節斷皮ノモノヲ上トス一種阿蘭陀甘  
草ト云アリ甚タ大ナリフトサ一寸餘ニ及フ形

美ナレ氏性特ニ劣ル用ユルニ不堪近世藥家ニ

朝鮮甘草ト稱スルアリ但味甜ニ過テ不好不堪

用南京福州共可用用藥須知

甘草 前編ニ出ツ和名アマクサ和方中ニ大和

ト出ス是ナリ此物特生蔓生ノ二種アリ又葉ニ

無毛有毛ノ二種アリ蔓生ハ根小ナリ藥肆ニ良

姜手ト呼フ至テ小ナルヲコナ藁手ト呼フナリ甘草

輪切ニスレハ粉ノ如クナルヲ粉甘草ト云フ省

テ粉草ト云フ用藥須知續編



甘草 富士甲斐ニ産ス莖葉萩ノ如シ根ハカツ  
ラノ如クナリ根ハ則甘草ナリ大ナル者良シ小  
ナルハ性ウスシトナリ賀云甲斐ニ産ス桑藤ニ  
似タリ莖葉氏ニ甘而有白毛上ノ御藥苑ニアリ  
今朝鮮黄莖トテ渡物アリ其氣味類甘草是物ハ  
抱罕草乎 別本ニ云ク本邦ニテハ在甲州桑藤  
ノ如ナリ花黄色ナリ和豆藤ト云モノ、花ニ似  
タリ蔓生スル者ナリ藟大苦其裏ヲ云ナリ 又  
甲州ノ民家ニアリ紫藤ノ初生及水黄莖ニ似タ

リ槐葉紫花葉味不甜奈リンキン畢豆アエトウ

黃藤見蔓草類頗黃藤也黃赤詳 都淋 馬兜鈴

ノ一名也 本草  
會誌

照任曰甲州石部トイフ所ヨリ甘草ヲ出ス又ヲ

フトイフ所ニモアリ二種アリ即チ獻上ス○重

康曰甲州石森村ヨリ甘草ヲ出ス又打栗トイフ

所ニモアリ土人曰昔ヨリアリテ甲州ノ名物ナ

リトイヘリ 先生按スルニ甘草和邦ニ所々ヨ

リ出ルトイヘ氏中華ノ佳ナルニ及ハス甲州地

方ニ出ルハ本草ニ説ク所ノ鯉魚腸トイフ物ニ  
チカシ申州ノ土人曰ク今甘草ヲ多ク出ス處ハ  
ムカシ武田信玄ノ藥園ノ跡ナルヨシ言傳フ採藥  
使記

甘草 大和本草ニ葉胡枝花ニ似タルトスルハ  
謬根ハ真ニハキニ似タルモノナリ葉ハコウ繖ゴウ繖ゴウ花  
ニ似タリ二種アリ一種大葉ノモノハ莖ニ毛刺  
アリ近時日本ニモ處處植養中土ノ者ニコトナ  
ルコトナシ古ヨリ富士甘草トテ富士山ヨリ出

ワ甘草ノ一種ニシテ中土ノ種ニハ稍劣レリ

大廣

和本  
草

甘草 和名抄ニアマキト訓ス延喜式載常陸陸

奥出羽三國獻之稻生先生曰今甲斐國地方山皆  
有之貝原先生曰近世甲斐國ヨリ多出奥州ニモ  
アリ直海氏曰古ヨリ富士甘草トテ富士山ヨリ  
出ト按スルニ今官園ニ所有ノモノ本甲斐國ニ  
出然氏山中多出ルヲ聞ズ又其他處産スルモ  
ノ未見之○甲斐産苗ノ長二三尺葉ハ紫藤葉ニ

似テ稍小ニメ微毛アリ根皮紫赤色肉黄色ニメ  
味甘シ此物甲斐國山梨郡上於曾村伊兵衛同郡  
下石盛村與兵衛園中ニアリ其始所出未詳或云  
甲斐深山中ヨリ出ワ或云武田信玄漢土ヨリ得  
テ植ルモノ今尚存スト何レ力是ナルヲ知ズ  
享保中阿部將翁軒 台命ヲ奉メ甲斐國ニ至テ  
是ヲ得タリ今東都及駿府官園ニアルモノ是ナ  
リ駿府ニテハ甚繁茂ス東都ニテハ繁茂セズ戸  
田先生非藥選曰一種稱南京樣者御園之種而人



間幾布ト令官園ニ此種ナシ又甘草苗漢土ニ微

クヲ聞ス物類品

甘草 アマキ和名 アマクサ同上 大和和方 カン

サ名 一名主種名 偷蜜珊瑚和方 大嗽車物

○甘草ニ同名アリ茶薺甘藤モ甘草ト名ク 船

來ニ數種アリ南京ヲ上トシ福州ヲ次トス新渡

ノ福州ハ甚大ニシテ緊實ナラス南京ハ皆細ク

片潤アリ南京ノ中ヨシボト名ケテ外皮縦ニ小

皺紋アリ緊實ナルヲ揀ヒ用ヒ一シ凡ソ甘草ハ

根ノ大小ニ拘ラス外皮薄ク肉色深黄ナル者佳  
ナリ根大ナリト雖皮厚ク肉色淺ク輕虚ナル者  
ハ良ナラス其朽テ黑色ヲ帶ヒ或ハ蛀者ハ並ニ  
用ルニ堪ズ本經逢原ニ中心黑者有毒勿用ト云  
市人根ノ最細小ナル者ヲワラ手或ハワラ甘草  
ト呼フ下品ノ稱ナリ形歪斜ニメ節アル處ヲ揀  
ヒ出シ對賣ヲキリコミト云櫃中ニテ折碎タル  
者ヲ折甘草ト云フ朝鮮甘草ハ味過テ甜シ良  
ナラス紅毛甘草ハ甚大ナリ味ハ美ナレ氏性劣

ト云 延喜式典藥寮諸國貢藥目次ニ常陸陸奥

出羽ヨリ甘草ヲ獻スルヲ載タリ今ハ各國自

生アルヲ聞ス世上ニ栽ルモノ亦南京福州ノ

二種アリ然レ南京ノ種甚タ稀ナリ福州ノ種ハ

甲斐國山梨郡上於曾村伊兵衛下石盛村與兵衛

等ノ園中ニ傳ヘ栽シモノ弘メリ京師浪華ノ種

樹家ニモ多シ奥州南部ニモ多ク時テ藥用スト

云其ノ苗春舊根ヨリ生ス高サ二三尺其ノ葉互

生形シラフゲノ葉ニ似テ莖葉ニ毛刺アリ花ハ

豆花ニ似テ淡紫色葉間ニ簇生スト云其實莢ヲ  
ナス小豆莢ニ似タリ子モ相似テ扁ク小シ秋深  
ルニ至テ苗枯ル其根横行メ藤蔓ノ如シ外皮紫  
赤色肉黄色味甘シ享保以來舶來南京甘草櫃中  
ヨリ得ル處ノ子ヲ下シテ生スルヲ數度其形狀  
福州ノ種ニ異ナラス只葉圓大ニメ莖葉糙澀ナ  
ラス粉草ハ粉甘草氏書ノ上品ノ稱ナリ本草  
原始ニ據ルニ卽汾草ノ誤汾州ニ生スル者佳ナ  
レハナリ今粗皮輕虛ナルモノ薄ク切レハ皆碎

ケテ細末トナルモノヲ以テ粉草ト為ハ非ナリ

本草綱目  
落蒙

荅、此說可也先ツ甘草トミルヘシ、葉似槐而

蔓延ト云ハ誤也葉ハ槐ニ似テ蔓延セヌ也蔓延

タルハ根也莖ノ蔓延メ葉槐ニ似タリト云ハ黃

耆ノ下也○今諸國ニ出ルト云ハ誤ナリ

詩經名  
物辨解

正誤

甘草 國老アマキ南京色黃ニ味甘キモノ佳也

蠻手大キナルモノヲ藥舖ホクテウトヨブ功劣



レリ朝鮮アリ和アリトモニヨカラズ用ユヘカ

ラズ

藥品手  
引草

甘草

〔番名〕クキリンチヤ

毛紅

若水先生曰姦商南

天燭莖ヲ以テ雜ヘ貨ル宜<sup>ニ</sup>擇<sup>ル</sup>用<sup>ニ</sup>

千金方  
藥註

隰有苓

傳苓大苦集傳苓一名大苦葉似地黃卽

今甘草也○集傳從爾雅註而形狀不類藥中甘草

沈存中乃謂黃藥也郭必別有所指

毛詩品物  
圖攷

龔氏曰春載南方人有患病者每延醫至診視後止

索一方今人構藥于市正聞彼土風俗今猶爲然天

明壬寅歲浪華船商十數人飄泛到福州地留月餘  
其內一人染時疾縣司差醫日就客館診醫不自調  
藥唯疏其方而去衙卒乃携方索買之藥舖而其煎  
藥將鐵蕉十餘本搥根收土投諸水中攪澄用之曰  
鐵蕉從日本所僂來株猶帶其地土今用此水猶用  
其土水必無不服水土之患也蓋其用心切矣予嚮  
得其藥索二紙紅箋縱九寸橫五寸字厠行草其一  
曰冶郎初一日洋參五分麥門一匁去心川石斛二  
匁新會皮三匁穀芽一匁炒生苡仁二匁雲苓一匁

甘草一匁加東洋土攪水澄清代水煎

腎膜

濟世拔華載遺山阿魏散治骨蒸傳尸等勞寒熱羸  
劣困倦喘嗽右阿魏三錢研青蒿壹握細切東北桃  
枝一握細剉□□□病人中指許大男左女右以童  
子小便二升半隔夜浸藥明且煎取一大升空心溫  
服分爲三服進次服攪柿末三錢如人行十里更一  
服服至一二劑卽吐出蟲子或洩瀉更不須服餘藥  
若未吐利卽當盡服病在上卽吐在下卽利皆出蟲  
如馬尾人髮卽差萬金後藥可以當之予嘗欲試用

此方然所缺三字未知何字亦無他本可校因姑置之  
後偶閱王漁洋居易錄引元邁山續夷堅志載此  
方所缺乃甘草如三字遂得補完之但此藥如斯邦  
人不堪臭因改爲丸子用之頗有效驗噫此三字不  
得之方書中而校補不量於說部而得之者抑亦奇  
矣醫焉可不涉獵群籍乎

醫勝

陸粲庚巳編云盛御醫寅一日晨入御藥房忽頭痛  
昏眩欲絕群醫束手莫知何疾勅募人療治有草澤  
醫人請見投藥一服逡巡卽愈上奇之召問所用何

方對曰寅空心入藥室卒中諸藥之毒能和諸藥者  
甘草也臣用是爲湯以進耳非有他術也上詰寅果  
未最寢而入乃厚勞其人云龔氏回春載藥室家人  
正剉藥忽仆地不省人事此非病也必藥氣薰蒸中  
於藥毒令與甘草煎湯灌之立醒蓋本于此

醫勝

三因方露宿湯方中用若水瘡一掌大人無辨其爲  
何物焉攷程月溪釋方露宿湯詩云露宿青榴皮椿  
櫟草藥宜杏仁甘草剉烏梅薑片隨知若水瘡是椿  
櫟奇効良方亦無若水瘡有椿根皮而施氏續易簡



永類鈴方作苦水瘡王氏易簡治痢藥中有苦水桐  
瘡桐音相近豈桐訛爲瘡乎百一選方引泊宅編載  
椿根止痢之功當並考

醫賸

東醫寶鑑露宿湯方云苦水  
瘡一掌大即椿根白皮

吳旻續扶壽精方屠蘇飲方曰古屠蘇菴仙人遺方  
年除日五更將一餅入酒沤熟合家各飲一二鍾一  
年之內瘟不侵染是驗鬼箭羽一錢茅山朮二錢赤  
小豆四十九個乳香一錢梅花瓣一錢桃仁一錢荷  
花蕊一錢菊花頭一錢吳茱萸三分甘草共爲細末

臘月除日煉蜜和丸如黄豆大成餅用上好雄黃爲衣醫賸

甘草一名太苦本草和名蕭同偷蜜珊瑚賴耕和事

草清異錄甘露龍芽和名磨度野瑟置梵書牟素佉水同上

和名アマキ本草和名アマクサ和名シラフジ藻類大

和書和方蠻名スートホート阿蘭クキリシーヤ 甘

草ニ同名アリ正字通ニ茶ヲ甘草ト云漳州府志

ニ甘藤ヲ甘草ト云典籍便覽ニ薺ヲ甘草ト云

甘草ハ春宿根ヨリ生ス葉ハ紫藤葉ニ似テ稍小

微槎蒴アリ圓莖ニ互生シ高サ一二尺根年ヲ經  
 ルモノハ布ニ穂ヲ葉間ニ生シ花アリ形胡枝花  
 ニ似テ淡黄色頗黄著ノ花ニ似タリ後莢ヲ結一  
 寸餘又黄著角ニ似テ扁シ根ノ形モ又黄著ニ似  
 テ皮黄色味甘シ漢種ノ物ニシテ南京種ナルベ  
 シ一種ハ葉小ニメ根蔓ノ如ク土中ヲ延節アリ  
 テ節ノ處ヨリ芽ヲ生ス節ヲコメテ切テ種レバ  
 ヲク生スコレ福州種ナルベシ舶來數種アリ南  
 京ヲ上トシ福州ヲ次トス南京ノ中コシボト名

ツケテ皮ニ皺紋アリテ堅實ナルヲ用ベシ蘭山  
云市人根ヲ最細小ナル者ヲワラデ或ハワラ甘  
草ト呼フ下品ナリ形斜ニメ節アル處ヲ棟ヒ出  
シ判ミ賣ルコレヲキリコミト云フ櫝中ニテ折  
タル物ヲ折甘草ト云紅毛甘草ハ甚大ニメ廻リ  
三四寸ナルモノアリ外薄黒ク肉純黄色味甜シ  
ト云トモ性劣ルト云延喜式ニ諸國ヨリ甘草ヲ  
獻スルヲアレヒ今其國ニナシ先輩云福州種ハ  
甲州山梨郡上ヲソ村伊兵衛下石森村與兵衛等

ノ園中并コマ郡中野村ヨリ出ルト云太田澄元  
 云奥州棚倉山中有甘草即大和甘草是也今諸國  
 二裁テ藥用ス近年信州ノ白沙ノ土地ニテ作ル  
 香祖筆記云西土甘草亦有成大樹者ト云粉草ハ  
 粉甘草ト書ノ上品ノ名也又宕大洲云東醫寶鑑  
 曰根之粉出故號爲粉草又飲膳正要ニ甘草ヲ服  
 スルハ崧萊海藻ヲ忌ルト云ヘリ

本草穿要

甘草 本草和名云安麻伎之水義吳舶僦來惟大徑  
 寸新實正黃斷文鮮明彈之粉出即謂之粉草而味



濃甘者爲好輕虛細小者不宜吳氏從新云細者名  
統草蓋是也斯方原自生於甲斐石盛村緊細不堪  
用焉傳言此地武田機山氏藥圃之故墟也然今百  
歲後莫敢識其實者近攝津池田所養者味淡便不  
應風土耳本草序例云凡用藥必須擇州土所宜者  
則藥力具用之有據如上黨人參川蜀當歸齊州半  
夏華州細辛世擇藥材者宜察此語或云駿河御  
苑養藥甘草不知果然○諸集爾雅藟大苦郭璞云  
甘草也疏云古人倒語姜孟錫爾雅參義云按以甘

草疑與大苦之名不協然衛風簡兮詩傳實引此文此所謂古語不嫌倒用也然則以苦爲甘猶以治爲亂以汚爲澣之類歟嘗讀沈括筆談括辯其非以爲黃藥藥按清吳舒爲徐園秋花譜云藟之花實似甘草而叢生則異其根苦似黃藥而無藤蔓別是一物結角角拆子出如豆而青故名青藟子堅不可嚙正與甘草子同但略大剝之其肉白而甘美唐陸龜蒙爲四明謝遺塵詠詩云山實號青藟絲岡次第生則形堅綠殼中味敵瓠英皮日休和詩形同玉腦圓皆

是實錄因傳寫誤作青桂致後人漫無所考又詩經  
隰有苓先見邶風而引唐風首陽采苓傳會甘草所  
產地不知此物在江南亦多也并記之以俟博物君  
子采焉

本草綱目  
纂疏

撈海一得ト云フ書ニ曰ク唐土ノ茶店ニハ色々  
ノ煎湯ヲ賣ルコトナリ茶モアリ甘草湯モアリ  
砂糖湯モアリ橘皮湯モアリ故ニ本草甘草ノ集  
解ニ唯貨湯家ニ是ヲ用スト云語アリ貨湯家ト  
ハ湯ヲ賣ル店ナリ

北勝撰

ス 草 子

アマクサ 甘草 大嗽事 異名 カンザツ 甘草

アマ物品識  
クサ名

甘草 根 蘇頌曰堅實斷理者為佳兄形ノ大小ニ拘ラス外皮薄ク肉色深黄ニメ堅實ナ

ルモシヲ 舶來ニ南京福州ノ二品アリ南京ノモ

ノハ形細ク潤アリ上品トス福州ノモノハ形大

ニメ實セズ次品トス 本邦ニ福州種ヲ裁シモ

ノ多シ藥舗ニ未タイデズ南京種ハ甚希ナリ 日用

藥品  
考

粉甘草 粉草 汾州ニ産スルヲ云 手板發蒙

修治炙甘草 古人藥ヲ制スル必ス炙熟生乾或  
ハ炮炒煨燂煨燂曝露飛伏製度等ノ法ヲ詳ニス  
此レ皆立方ノ妙旨後人ノ能ク及フ所ニアラス  
近世香川秀菴翻刻ノ傷寒論凡例云至炙熟等字  
亦皆一掃止存分兩無幾長沙之旨ト今人多ク此  
語ニ從フ然レモ炙熟等ノ文字ヲ刪去レテ古人  
ノ本旨ヲ得ルナラハ炙甘草生薑乾薑等ヲモ炙  
ノ字生乾ノ二字共ニ刪去スヘシ然ルニ此等ノ  
字ハ刪ルヲ能ハス且フ序文云今且依成本不敢




加改竄亦存舊之意也トソノ前後矛盾スルヲ此  
ノ如シ古人云賣藥者兩眼用藥者一眼服藥者無  
眼杏川氏ノ如キハ一眼ニメ衆人ヲ無眼ニ陷ラ  
シム豈無眼ニシテ疾病ヲ治スヘケンヤ 氣味  
木苦參 徐彥純本草發揮本作朮ニ物ノ名ナリ  
又反大戟羌花 云 古今醫統ニ產後轉胞ヲ治ス  
ルニ甘遂ノ末八錢ヲ飯糊ニ和シ臍下ニ貼シ甘  
草六錢ノ煎汁ヲ頻服セシム方後云及藥汁至臍  
藥相反胞自轉ト此法神驗アリ危篤ヲ救フヘシ

今人多クハ相畏相反等ノ理ヲ會セス須ク本草  
綱目ノ序例ヲ讀ムヘシ

重修本草綱目  
啓蒙

本草通串卷一

本草通串卷二



富山侍從兼長門守管原朝臣利保纂輯

山草

黃耆

黃耆味甘微溫主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾

五痔鼠瘻補虛小兒百病一名戴椹

神農本草經大觀本草

本草經曰黃耆味甘微溫生山谷

神農本草經太平御覽

黃耆

戴攷

本經

根

氣味

甘

微溫

無毒

主治

癰疽久敗

瘡

排膿

止痛

大風癰疾

五痔鼠瘻

補虛小兒百病

瘡

排膿

止痛

大風癰疾

五痔鼠瘻

補虛小兒百病

瘡

排膿

止痛

大風癰疾

五痔鼠瘻

補虛小兒百病

瘡

排膿

止痛

大風癰疾

五痔鼠瘻

補虛小兒百病

神農

本經

○本

草綱目

黃耆

味甘

微溫

無毒

癰疽久敗

瘡

排膿

止痛

大風癰疾

五痔鼠瘻

補虛小兒百病

瘡

排膿

止痛

大風癰疾

五痔鼠瘻

補虛小兒百病

瘡

疾

五痔鼠瘻

補虛小兒百病

婦人子臟

風邪氣逐

五

臟間惡血

補丈夫虛損

五勞羸瘦

止渴腹痛

洩痢益

臟間惡血

補丈夫虛損

五勞羸瘦

止渴腹痛

洩痢益

臟間惡血

補丈夫虛損

臟間惡血

補丈夫虛損

五勞羸瘦

止渴腹痛

洩痢益

臟間惡血

補丈夫虛損

五勞羸瘦

止渴腹痛

洩痢益

臟間惡血

補丈夫虛損

五勞羸瘦

止渴腹痛

洩痢益

臟間惡血

補丈夫虛損

五勞羸瘦

氣利

陰氣

神農本草經疏

○吳懷祖輯要

神農本草經疏

○吳懷祖輯要

神農本草經疏

○吳懷祖輯要

神農本草經疏

○吳懷祖輯要

神農本草經疏

○吳懷祖輯要

神農本草經疏

○吳懷祖輯要

神農本草經疏

○吳懷祖輯要

神農本草經疏

○吳懷祖輯要

黃耆

味甘

微溫

主癰疽久敗

瘡

排膿

止痛

大風癰疾

五痔鼠瘻

補虛小兒百病

瘡

排膿

止痛

大風癰疾

五痔鼠瘻

補虛小兒百病

瘡

排膿

五痔鼠瘻

補虛小兒百病

瘡

排膿

止痛

大風癰疾

五痔鼠瘻

補虛小兒百病

瘡

排膿

止痛

大風癰疾

五痔鼠瘻

補虛小兒百病

瘡

排膿

止痛

大風癰疾

神農本草經疏

○百種錄



黃耆無毒主婦人子藏風邪氣逐五藏間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣生水者冷補其莖葉療渴及筋攣癰腫疽瘡一名戴椹一名獨椹一名芰草一名蜀脂一名百本生蜀郡山谷白水漢中二月十月採陰乾

名醫別錄○大觀本草

黃耆

戴椹

別錄又獨椹

芰草

別錄又蜀脂

百本

別錄

〔集解〕別錄

曰黃耆生蜀郡山谷白水漢中二月十月採陰乾氣味白水者冷補別錄婦人子藏風邪氣逐五臟間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣

別錄莖葉主治瘰癧及筋攣癰腫疽瘡

別錄名醫別錄本草綱目

六十曰耆耆指也不從力政指事使人也

爾雅釋名

耆老也从老省旨聲渠脂切說文

陶隱居云第一出隴西岷陽色黃白甜美今亦難得

次用黑水宕昌者色白肌膚麤新者亦甘溫補又有

蠶陵白水者色理勝蜀中者而冷補又有赤色者可

作膏貼用消癰腫俗方多用道家不須

神農本草陶弘景註○大

觀本草

集解弘景曰第一出隴西岷陽色黃白甜美今亦難

得次用黑水宕昌者色白肌理粗新者亦甘而溫補  
又有蠶陵白水者色理勝蜀中者而冷補又有赤色  
者可作膏貼俗方多用道家不須發明弘景曰出隴  
西者溫補出白水者冷補又有赤色者可作膏用消  
癰腫

神農本草陶弘景  
註○本草綱目

雷公云凡使勿用水薺草真相似只是生時葉短并  
根橫先湏去頭上皺皮了蒸半日出後用手擘令細  
於槐砧上剉用

炮炙論○  
大觀本草

雷斅曰凡使勿用水薺草真相似只是生時葉短并

根橫也須去頭上皺皮蒸半日擘細於槐砧上剉用

炮炙論  
本草綱目

徐之才曰伏苓為之使惡龜甲白鮮皮  
藥對○本  
草綱目

耆支渠伊切長老也耆支同耆  
玉篇

黃耆一名玉孫治發背內補主虛喘腎衰耳聾療寒

熱生隴西者主補五藏蜀白水赤皮者微寒此治客

熱用之  
藥性論○  
大觀本草

釋名王孫  
藥性論  
主治甄權曰主虛喘腎衰耳聾療寒

熱治發背內補  
藥性論○  
本草綱目

黃耆味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風  
癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病婦人子臟風邪氣逐  
五臟間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢  
益氣利陰氣生白水者冷補其莖葉療渴及筋攣癰  
腫疽瘡一名戴椹一名戴槩一名獨槩一名芟草一  
名蜀脂一名百本生蜀郡山谷白水漢中二月十月  
採陰乾

千金翼方

唐本注云此物葉似羊齒或如蒺藜獨莖或作叢生  
今出原州及華原者最良蜀漢不復採用之

唐本注  
大觀



本草

集解 然曰今出原州及華原者最良蜀漢不復采

用宜州寧州者亦佳

唐本草注  
○本草綱目

蕭炳云出原州華原谷子山黃花

四聲本草  
大觀本草

發明藏器曰虛而客熱用白水黃耆虛而客冷用隴

西黃耆

本草拾遺  
○本草綱目

也波良久佐

味甘久

少香之

四月發花八月洗根

日尔乾

之用大同類  
聚方

臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似羊齒草獨莖枝葉

扶疎紫花根如甘草皮黃肉白長二三尺許今原州

者好宜州寧州亦佳

蜀本草掌禹錫按○大觀本草

黃耆

弱久佐新選字鏡

黃耆一名戴糝

仁諧音蘇慘反

一名戴槩一名獨槩一名芰

草

楊玄操音作芰巨寄反

一名蜀脂一名百本和名也波良

久佐一名加波良佐ニ介

本草和名

雜給料

ヤ、ラ、ク、サ黃耆六兩

○左右近衛府各四十七種

ワ、フ、ク、サ黃耆八兩

○山城國黃耆十斤○伊勢國黃耆十一

斤○尾張國黃耆四斤○參河國黃耆一斤○甲斐

國黃耆十斤○相模國黃耆一斤○常陸國黃耆四斤○上野國黃耆十斤○越中國黃耆三斤○播磨國黃耆三斤四兩○備前國黃耆九斤○備中國黃耆八斤五兩

延喜式

黃耆

本草云黃耆和名夜波良久佐

和名類聚鈔

日華子云黃耆惡白鮮皮助氣壯筋骨長肉補血破癥癖瘰癧贅腸風血崩帶下赤白痢產前後一切病月候不勻消渴痰嗽并治頭風熱毒赤目等藥中補益呼爲羊肉又曰白水耆涼無毒治血及煩悶熱毒

骨蒸勞功次黃耆赤水耆涼無毒治血退熱毒餘功  
用並同上水耆涼無毒治煩排膿力微於黃耆遇闕  
卽倍用之

曰華本草  
大觀本草○

〔主治〕助氣壯筋骨長肉補血破癥癖瘰癧贅腸風  
血崩帶下赤白痢產前後一切病月候不勻疲嗽頭  
風熱毒赤目〔發明〕大明曰黃耆藥中補益呼爲羊肉  
白水耆涼無毒排膿治血及煩悶熱毒骨蒸勞赤水  
耆涼無毒治血退熱毒餘功並同水耆涼無毒治煩  
排膿之力微於黃耆遇闕卽倍用之

曰華子大明  
本草綱目○

別說云謹按黃耆本出綿上爲良故名綿黃耆今圖經所繪憲水者即綿上地相隣爾若以謂柔耆如綿即謂之綿黃耆然黃耆本皆柔耆若偽者但以乾脆爲別耳

本草別說○大觀本草

集解承曰黃耆本出綿上者爲良故名綿黃耆非謂其柔耆如綿也今圖經所繪憲州者與綿上相隣

本草

別說○本  
草綱目

圖經曰黃耆生蜀郡山谷白水漢中今河東陝同州郡多有之根長二三尺已來獨莖作葉生枝幹去地



二三寸其葉扶疎作羊齒狀又如蒺藜苗七月中間黃子花其實作莢子長寸許八月中採根用其皮拆之如綿謂之綿黃耆然有數種有白水耆有赤水耆有水耆功用並同而力不及白水耆水耆短而理橫今人多以首耆根假作黃耆拆皮亦似綿頗能亂真但首耆根堅而脆黃耆至柔韌皮微黃褐色肉中白色此為異耳唐許商宗初仕陳為新察王外兵參軍時柳太后感風不能言脉沈而口噤商宗曰既不能下藥宜湯氣熏之藥入腠理周時可差乃造黃耆防

風湯數斛置於牀下氣如煙霧其夕便得語藥力熏  
蒸其效如此因附著之使善醫者知所取法焉

○圖經  
大

觀本  
草

〔集解〕頌曰今河東陝西州郡多有之根長二三尺以  
來獨莖或作叢生枝幹去地二三寸其葉扶疎作羊  
齒狀又如蒺藜苗七月中開黃紫花其實作莢子長  
寸許八月中采根用其皮拆之如綿謂之綿黃耆然  
有數種有白水耆赤水耆水耆功用並同而力不及  
白水者水耆短而理橫今人多以苜蓿根假作黃耆

拆皮亦似綿頗能亂真但苜蓿根堅而脆黃耆至柔

勒皮微黃褐色肉中白色此為異耳

蘇頌圖經○本草綱目

防風黃耆世多相湏而用唐許嗣

嗣本羊晉切犯廟諱今改為嗣

宗為新蔡王外兵參軍王太后病風不能言脈沉難

對醫告術窮嗣宗曰餌液不可進即以黃耆防風煮

湯數十斛置床下氣如霧熏薄之是夕語

本草衍義○丹波元

胤訂正重刊宋本

衍義曰防風黃耆世多相湏而用唐許嗣已本羊耆

切犯廟諱今改為嗣宗為新蔡王外兵參軍王太后

病風不能言脉沉難對醫告術窮嗣宗曰餌液不可進即以黃耆防風煮湯數十斛置於床下氣如煙霧熏之是夕語

本草衍義  
大觀本草○

發明宗奭曰防風黃耆世多相須而用唐許胤宗初仕陳爲新蔡王外兵參軍時柳太后病風不能言脉沉而口噤胤宗曰既不能下藥宜湯氣蒸之藥入腠理周時可瘥乃造黃耆防風湯數斛置於牀下氣如煙霧其夕便得語也

本草衍義  
本草綱目○

原本草衍義唐許胤宗初仕陳爲新蔡王外兵參軍

時柳太后病風不能言脈沉而口噤隋宗曰既不能下藥宜湯氣蒸之藥入腠裏周時可瘥乃造黃耆防風湯數斛置於牀下氣如煙霧其夕便得語也

本草衍義

○廣群芳譜

黃耆有白水耆赤水耆木耆三種其莖葉曰戴椹曰

戴椹曰芰草曰蜀脂曰百本曰王孫

昆蟲草木略

珍云益胃氣去肌熱諸痛必用之

張元素珍珠囊湯液本草

元素曰味甘氣溫平氣薄味厚可升可降陰中陽也入手足太陰氣分又入手少陽足少陰命門治虛勞



自汗補肺氣瀉肺火心火實皮毛益胃氣去肌熱及  
諸經之痛發明元素曰黃耆甘溫純陽其用有五補  
諸虛不足一也益元氣二也壯脾胃三也去肌熱四  
也排膿止痛活血生血內托陰疽爲瘡家聖藥五也  
又曰補五臟諸虛治脉弦自汗瀉陰火去虛熱無汗  
則發之有汗則止之

元素  
本草綱目

象云治虛勞自汗補肺氣入皮毛瀉肺中火如脉弦  
自汗脾胃虛弱瘡瘍血脉不行內托陰證瘡瘍必用  
之去蘆用心云補五臟諸虛不足而瀉陰火去虛熱

無汗則發之有汗則止之

李東垣藥類法象○湯液本草

東垣云黃芪人參甘草三味退熱之聖藥也靈樞曰衛氣者所以溫分內而充皮膚肥腠理而司開闔黃芪既補三焦實衛氣與桂同特益氣異耳亦在佐使桂則通血也能破血而實衛氣通內而實外者欤桂以血言一作色求則芪爲實氣也惡鱉甲李東垣湯液本草果曰靈樞云衛氣者所以溫分內而充皮膚肥腠理而司開闔黃耆既補三焦實衛氣與桂同功特比桂甘平不辛熱爲異耳但桂則通血脉能破血而實衛

氣者則益氣也。黃耆與人參、甘草三味爲除躁熱、  
肌熱之聖藥。脾胃一虛，肺氣先絕，必用黃耆溫分肉、  
益皮毛、實腠理，不令汗出，以益元氣而補三焦。又曰：  
防風能制黃耆。黃耆得防風，其功愈大，乃相畏而相  
使也。又曰：小兒外物驚，宜用黃連安神丸鎮心藥。若  
脾胃寒濕，肚腹瀉痢，青白宜用益黃散藥。如脾胃  
伏火勞役不足之證，及服巴豆之類，胃虛而成慢驚  
者，用益黃理中之藥，必傷人命。當於心經中以甘溫  
補土之源，更於脾土中以甘寒瀉火，以酸涼補金，使

金旺火衰風木自平矣今立黃耆湯瀉火補金益土  
爲神治之法用炙黃耆二錢人參一錢炙甘草五分  
白芍藥五分水一大盞煎半盞溫服

李杲○本草綱目

**發明**震亨曰黃耆補元氣肥白而多汗者爲宜若面  
黑形實而瘦者服之令人胃滿宜以三拗湯瀉之又  
曰人之口通乎地鼻通乎天口以養陰鼻以養陽天  
主清故鼻不受有形而受無形地主濁故口受有形  
而兼乎無形柳太后之病不言若以有形之湯緩不  
及事今投以二物湯氣滿室則口鼻俱受非智者通

神不可回生也

朱震亨○  
本草綱目

黃芪 氣溫味甘純陽甘微溫性平無毒入手少陽  
經足大陰經足少陰命門之劑本草云主癰疽久敗  
瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病婦  
人子藏風邪氣逐五藏間惡血補丈夫虛損五勞羸  
瘦腹痛泄痢益氣利陰氣有白水芪赤水芪木芪功  
用皆同惟水芪莖短而理橫拆之如綿皮黃褐色肉  
中白色謂之綿黃芪其堅脆而味苦者乃首蓐根也  
又云破癥瘕腸風血崩帶下赤白痢及產前後一切



病月候不調消渴痰嗽又治頭風熱毒目赤骨蒸生  
蜀郡山谷白水漢中今河東陝西州郡多有之芪與  
桂同功特味稍異比桂但甘平不辛熱耳世人以苜  
蓿根代之呼為土黃芪但味苦能令人瘦特味甘者  
能令人肥也頗能亂真用者宜審治氣虛盜汗并自  
汗即皮表之藥又治膚痛則表藥可知又治咯血柔  
脾胃是為中州藥也又治傷寒尺脉不至又補腎藏  
元氣為裏藥是上中下內外三焦之藥今本草圖經  
只言河東者沁州綿上是也故謂之綿芪味甘如蜜

兼體骨柔軟如綿世以為如綿非也別說云黃芪水  
出綿上為良故圖經所繪者憲水者也與綿上相鄰  
蓋以地產為綿若以柔韌為綿則偽者亦柔但以乾  
脆甘苦為別耳

湯液  
本草

黃耆

惡龜甲白  
皮蜜炒用

味甘性溫無毒升也陽也其用有

四溫肉分而實腠理益元氣而補三焦內托陰証之  
瘡瘍外固表虛之盜汗

李杲藥  
性賦

集解好古曰綿上即山西沁州白水在陝西同州黃  
耆味甘柔軟如綿能令人肥昔諸根味苦而堅脆俗

呼爲土黃耆能令人瘦用者宜審主治主太陰虛疾  
陽維爲病苦寒熱督脉爲病逆氣裏急好發明好古

曰黃耆治氣虛盜汗并自汗及膏痛是皮表之藥治  
咯血柔脾胃是中州之藥治傷寒尺脉不至補腎臟

元氣是裏藥乃上中下内外三焦之藥也王好古本草綱目

發明機曰蕭山魏直著博愛心鑑三卷言小兒痘瘡

惟有順逆險三證順者爲吉不用藥逆者爲凶不必  
用藥惟險乃悔吝之象當以藥轉危爲安宜用保元  
湯加減主之此方原出東垣治慢驚土衰火旺之法

今借而治痘以其內固營血外護衛氣滋助陰陽作  
爲膿血其證雖異其理則同去白芍藥加生薑改名  
曰保元湯炙黃耆三錢人參二錢炙甘草一錢生薑  
一片水煎服之險證者初出圓暈乾紅少潤也將長  
光澤頂陷不起也旣出雖起慘色不明也漿行色灰  
不漿也漿定光潤不消也漿老濕潤不斂也結痂而  
胃弱內虛也痂落而口渴不食也痂後生癰腫也癰  
腫潰而斂遲也凡有諸證並宜此湯或加芎藭加官  
桂加糯米以助之詳見本書

黃耆 一名戴糝 一名戴槌 一名獨槌 一名芟草 一  
名蜀脂 一名百本 一名王孫生 蜀郡山谷及白水漢  
中河東陝西出綿上呼爲綿黃耆 今處處有之 根長  
二三尺 獨莖叢生 枝幹其葉扶疎 作羊齒狀 似槐葉  
微尖小 又似蒺藜葉 闊大而青白色 開黃紫花 紅槐  
花大結小尖角長寸許 味甘性微溫 無毒 一云味苦  
微寒 惡龜甲白蘚皮 救飢 採嫩苗葉燂熟換水  
浸淘洗去苦味 油鹽調食 藥中補益 呼爲羊肉

救荒本草

○農政  
全書



黃芩一名戴椹一名戴樅一名獨樅一名芟草一名  
獨脂一名百本一名王孫生蜀郡山谷及白水漢中  
河東陝西出綿上名爲綿黃著今處々有之根長三  
尺獨莖叢生枝幹其葉扶疎作羊齒狀似槐葉微尖  
小又似蒺藜葉濶大而青白色開黃紫花如槐花大  
結小尖角長寸許味甘性微溫无毒一云味甘微寒  
惡龜甲白蘚皮救飢採嫩苗葉煤熟換水浸淘洗去  
苦味油塩調食藥中補益呼爲羊肉治病

具見本草

救荒

本草○古今醫統

黃耆味甘氣微溫氣薄味厚可外可降陰中陽也無

毒種有三品治無兩般水耆莖短理橫功力殊劣此為

下欵歲多收倍用煎服亦宜本經不載州出黃耆處處有之如後又

賤自產穀但饑年多收亦可代糧也水耆生白水赤水二俱屬白水

頗勝此為中品綿耆出山西沁州綿上鄉名有此品極佳

此為上品咸因地產僉名總待秋採入藥久昭易甞勤曝

難侵務選單股不岐直如箭幹皮色褐潤肉白心黃

折柔軟類綿嚼甘甜近蜜如斯應病獲効如神市多

採苜蓿根假克謂之土黃耆媒利殊不知此堅脆音翠

味苦能令人瘦耆柔軟味甘易致人肥每被亂真尤  
宜細認夫耆者惡白鮮龜甲製去頭刮皮生用治癰  
疽瘰癧補虛損入手少陽手足太陰主丈夫小兒五  
勞七傷骨蒸體瘦消渴腹痛瀉痢腸風治女子婦人  
月候不勻血崩帶下胎前產後氣耗血虛益元陽瀉  
陰火扶危濟弱畧亞人參溫分肉而克皮膚肥腠理  
以司開闔固盜汗自汗無汗則發有汗則止托陰瘡  
癰瘡排膿止痛長肉生肌外行皮毛中補脾胃下治  
傷寒尺脈不至是上中下内外三焦藥也性畏防風

而防風能制黃耆黃耆得防風其功愈大蓋相畏而相使者故二味世多相須而用行義又云因多補益之功藥中呼為羊肉久服勿已耐老延年謨按參耆甘溫俱能補益證屬虛損堪並建功但人參惟補元氣調中黃耆兼補衛氣實表所補既畧差異共濟豈可等分務尊專能用為君主君藥宜重臣輔咸輕君勝乎臣天下方治臣強于主國祚漸危此理勢自然藥劑倣之亦不可不注意也如患內傷脾胃衰弱飲食怕進怠惰嗜眠發熱惡寒嘔吐泄瀉及夫脹滿痞

塞力之形羸脉息虛微精神短少等證治之悉宜補  
中益氣當以人參加重爲君黃耆減輕爲臣若係表  
虛腠理不固自汗盜汗漸致亡陽併諸潰瘍多耗膿  
血嬰兒痘疹未灌全漿一切陰毒不起之疾治之又  
宜實衛護榮須讓黃耆倍用爲主人參少入爲輔焉  
是故治病在藥用藥由人切勿索驥按圖務須活潑  
潑地先正嘗曰醫無定體應變而施藥不執方台宜  
而用又云補氣藥多補血藥亦從而補氣補血藥多  
補氣藥亦從而補血佐之以熱則熱佐之以寒則寒



如補中益氣湯雖加當歸血藥也因勢寒則被參耆  
所據故專益氣參耆又當歸補血湯縱倍黃耆黃耆  
氣藥也爲性緩亦隨當歸所引惟以補血標首佻肉  
桂附子少熱八味丸云然加黃耆知母微寒補陰丸  
是兩舉隅而反觸類而推則方藥之應乎病機病機  
之合乎方藥總在君臣佐使之弗失纔致輕重緩急  
之適中時醫不以本草加工欲望製方如是之通變  
合宜者正猶學射而不操矢弓矢其不能也決矣

本草

蒙  
筌

集解嘉謨曰綿上江州鄉名今有巡檢司白水赤水  
二鄉俱屬隴西發明嘉謨曰人參補中黃耆實表凡  
內傷脾胃發熱惡寒吐泄急卧脹滿痞塞神短脉微  
者當以人參爲君黃耆爲臣若表虛自汗亡陽潰瘍  
痘疹陰瘡者當以黃耆爲君人參爲臣不可執一也

陳嘉謨  
本草綱目

黃耆味甘性微溫無毒入肺脾二經內托已潰瘡瘍  
生肌收口外固表虛盜汗膝理克盈惡龜甲白蘚皮  
按黃耆之用專能補表肺主皮毛脾主肌肉故均

入之已潰瘡瘍及盜汗皆表虛也故咸用之裏虛者忌服恐外氣於表愈致其虛表邪者忌服恐益其邪也惟表虛邪寒不發汗者可酌用之生者亦能瀉火

雷公云

凡使勿用水煮草真相似只是生時葉短并根橫先須去頭土破了煎半日出後用

手摩令細於槐砧上剉用○鵝補雷公炮熊氏曰黃芪動三焦之火製藥性解

釋名黃芪

目

○時珍曰耆長也黃耆色黃為補藥之

長故名今俗通作黃芪或耆者非矣耆乃耆龜之耆

音尸王孫與杜蒙同名異物集解時珍曰黃耆葉似

槐葉而微尖小又似蒺藜葉而微闊大青白色開黃

紫花大如槐花結小尖角長寸許根長二三尺以緊  
實如箭筈者為良嫩苗亦可煉淘始食其子收之十  
月下種如種萊法亦可修治時珍曰今人但搥扁以  
密水塗炙數次以熟為度亦有鹽湯潤透器盛於湯  
瓶蒸熟切用者

本草綱目

黃耆氣味甘溫無毒氣薄味厚可升可降陰中陽也

入手足太陰氣分又入手少陽足少陰并命門

陶隱居曰

出隴西洮陽色黃白甘美次出黑水宕昌者色白肌  
理粗亦甘而溫補又有豔陵白水者色理勝蜀中  
蘇氏曰今出陝西宜寧州郡多有之收于仲冬下種  
春生苗獨莖或作叢生枝輪去地尺許其葉扶疎如



平齒狀七八月開黃紫色花其實結小如角旋子長寸許八月中采根長一二尺折之如繩然有數種出隴西白水赤水二鄉白水者赤水者功用同而白水者更佳出山西沁州綿上者益勝用者以紫實如紫幹皮色黃折之柔熟如綿肉理中黃外白噴之甘美可口者良嫩苗亦可茹食修治切片以藥湯調飲外黃用○若堅脆味苦者即首端根也折之亦柔韌如綿頗能亂真但黃耆皮黃肉白中亦深黃味甘為真耳○外一種水黃耆者形類真似只是生時其莖葉短根理積有不同也誤用伐人元氣辨之○李時珍曰耆長也色黃為補藥之長故名○黃耆補肺健脾胃實衛欬汗驅風

運毒之藥也故陽虛之人自汗頻來乃表虛而腠理不密也黃耆可以實衛而欬汗傷寒之證行發表而邪汗不出乃裏虛而正氣內乏也黃耆可以濟津以



助汗賊風之疴偏中血脉而手足不隨者黃耆可以  
榮筋骨癰瘍之證膿血內潰陽氣虛而不愈者黃耆  
可以生肌肉又陰瘡不能起發陽氣虛而不潰者黃  
耆可以托膿毒東垣謂益元氣補三焦之虛損實滕  
理溫肉分之虛寒功在是矣若夫虛冷沉寒乃元陽  
之不足雖用薑桂朮附之屬而無參耆之藥則不能  
溫經以回陽陰虛不足陽邪下陷于陰經雖用外提  
透達之類而無參耆之劑則自上而復下也故補中  
益氣湯用參耆爲君升柴爲佐癰疽托裏  
耆

獨用使腠理固密而餘毒不能妄攻于內若痘瘡用此以保元胎前用此以全育產後用此以輔正傷寒用此以補中逐邪久病用此以和營衛生津液調血氣也錢氏治小兒脾胃虛寒腹痛嘔吐瀉利青白宜益黃散以黃耆倍用又痘瘡毒化漿成所賴脾氣充盛內固營血外護衛氣用保元湯以黃耆爲重而痘有順逆險三證惟險乃悔吝之象吉凶未定須資藥力以治之險證初出乾紅少潤將長頂陷不起旣起色慘不明漿行色灰不榮漿定光潤不消漿老濕潤

不收結痂胃弱內虛痂落口渴不食痂後生毒毒漬  
歛遲凡有諸證並宜此湯如是推之則他證治例亦  
可詳矣○集方治陽虛腠理不密自汗頻來用黃耆  
一兩白朮五錢白芍藥一錢乾薑一錢五分大棗十  
枚水煎服○治傷寒裏虛表實行發散藥邪汗不出  
身熱煩躁六脉空數用黃耆一兩桂枝三錢白芍藥  
人參各二錢甘草八分柴胡一錢五分加生薑三片  
黑棗三箇水煎服○治風邪偏中血脉手足不隨口  
眼喎斜用黃耆防風各五錢人參白朮各三錢天麻

半夏各二錢當歸肉桂各一錢五分水煎服○治癰  
瘍潰後不論五善七惡證用黃耆八兩金銀花二兩  
人參一兩穿山甲火燒五錢水煎服○治陰毒不起  
內陷不潰飲食不入或大腸作瀉陽虛氣脫之證用  
黃耆二兩人參一兩肉桂附子童便製各五錢穿山  
甲火燒三錢水煎服○治痘瘡七八日後漿汁未充  
或乾枯不起或漿汁不濃種種虛寒證見者用黃耆  
五錢人參一錢或二三錢桂枝一錢白芍藥酒炒一  
錢五分穿山甲火燒二錢水煎服泄瀉不食加附子

童便製一錢木香五分肉桂八分水煎服○治男子  
氣虛白濁女人氣虛白帶用黃耆茯苓各一兩人參  
白朮各八錢兎絲子二兩俱炒燥爲末每服二錢空  
心白湯調下○治男婦童幼諸虛不足而色痿黃煩  
悸焦渴飲食減少或先渴而後發瘡瘍或先癰疽而  
後燥渴用嫩生黃耆六錢炙甘草一錢水煎服日一  
劑○治老人虛秘大便不通用嫩白生黃耆一兩陳  
皮五錢俱爲末大麻子一合研爛和勻每日煉蜜五  
匙調藥末三錢常服無秘結之患○治腸風瀉血用



嫩白黃耆二兩川黃連五錢俱微炒磨爲末紅麴研  
末打稀糊爲丸如菉豆大每服百丸米湯下○治欬  
嗽膿血咽乾乃虛中有熱用嫩白黃耆四兩甘草八  
錢真北沙參二兩共爲末每早晚俱食前服三錢白  
湯下○治氣虛胎動不安腹痛下黃水用嫩白黃耆  
二兩真川芎五錢當歸身一兩糯米一合水五碗煎  
砲半徐徐服○治婦人血崩不止用黃耆人參麥門  
冬各四錢北五味子七分杜仲熟地黃山茱萸各三  
錢真阿膠二錢川續斷黑荊枝各一錢河水煎服卽

止本草綱目

黃耆生赤水鄉名赤水耆生白水鄉名白水耆生山

西沁州綿上名綿耆咸因地命名又云花黃紫色根

長一二尺皮黃肉白折之如綿故謂之綿黃耆夫耆

老歷年久而性不燥此藥性緩如之因名耆直如箭

者佳製去頭刮皮生

用治癰瘡灸益損

○世多採苜蓿根中黃謂之土黃耆不知苜蓿根堅而脆肉

黃耆耆軟而綿肉白此為異耳

雷公云凡使勿用水耆草與根相似

須去頭土破了蒸半日出後用手掣令細于始未草原

槐砧上剉用○熊氏曰黃耆動三焦之火

藥性相反玄參惡黃耆典藉便

黃芪味甘氣微溫氣薄而味厚可升可降陽中之陽也無毒專補氣入手太陰足太陰手少陰之經其功用甚多而其獨效者尤在補血夫黃芪乃補氣之聖藥如何補血獨效蓋氣無形血則有形有形不能速生必得無形之氣以生之黃芪用之于當歸之中自能助之以生血也夫當歸原能生血何藉黃芪不知血藥生血其功緩氣藥生氣其功速況氣分血分之藥合而相同則血得氣而速生之何疑哉或疑血得氣而生少用黃芪足矣卽下少用與當歸乎用亦得

何故補血湯中反少用當歸而倍用黃芪不知補血之湯名雖補血其實單補氣也失血之後血已傾盆而出卽用補血之藥所生之血不過些微安能遍養五臟六腑是血失而氣亦欲失也在血不能速生而將絕未絕之氣若不急爲救援一旦解散頃刻亡矣故補血必先補氣也但恐補氣則陽偏旺而陰偏衰所以又益之當歸以生血使氣生十之七血生十之三則陰陽有制反得大益生氣而又生血兩偶他害也至于補中益氣湯之用黃芪又佐人參以成功者

也人參得黃芪兼能補營衛而固腠理健脾胃而消  
痰助升麻柴胡以提氣于至陰之中故益氣湯中無  
人參則升提之力多加黃芪白朮始能升舉倘用人  
參白朮而減去黃芪斷不能升氣于至陰也故氣虛  
之人毋論各病但當兼用黃芪而血虛之人尤宜多  
用李巖許云無黃芪不能提氣于至陰創論亦確論惟骨蒸癆熱與中滿之  
人忌用然亦當臨症審量○或問黃芪性畏防風而  
古人云黃芪得防風其功愈大謂是相畏而相使也  
其說然乎此說亦可信不可信之辭也黃芪無毒何



畏防風無畏而言畏者以黃芪性補而防風性散也

合而用之則補者不至大補而散者不至大散故功

用反大耳

李巖評云黃芪欲防風者以防風能通達上下周身之氣得黃芪而生黃芪達表防

風禦風外來之風得黃芪而拒絕也

○或問黃芪補氣反增脹滿似乎

黃芪不可補氣也豈芍藥以解其脹抑可不用黃芪

耶夫黃芪乃補氣藥氣虛不用黃芪又用何藥然服

之而增脹滿者非黃芪之助氣乃黃芪之不助氣也

陰陽有根而後氣血可補陰陽之根將絕服補藥而

反不受補藥見病不能受亦不去補病矣此黃芪補

氣而反增脹滿乃不生氣之故然亦因其不可生而  
不生也又豈有則藥以解其脹哉○或問黃芪氣分  
之藥吾子以為補血之品是風有血虛之症但宜用  
黃芪矣何以古人用補血之藥多用四物湯佛手散  
絕不見用黃芪之補血者豈古人非歟古人未嘗非  
也第以血症不同有順有逆順則宜用血藥以補血  
逆則宜用氣藥以補血也蓋血症之逆者非血逆而  
氣逆也氣逆而後血逆耳血逆而仍用血分之藥則  
氣不順而血愈逆矣故必須補氣以安血也氣逆則

血逆氣安則血安此不易之理也凡血不宜上行嘔  
咯吐衄之血皆逆也血猶洪水之逆則泛濫于天下  
血逆則騰沸于上焦徒治其血又何易奏平成哉故  
必用補氣之藥于補血之中雖氣生失血亦氣行夫  
血也此黃芪補血湯所以獨勝于千古也○或問黃  
芪以治氣逆之血發明獨絕然而亦有用四物湯佛  
手散以止血而效者又是何故洵乎吾子之善問也  
夫血逆亦有不同有大逆有小逆大逆者必須補氣  
以止血小逆者亦可調血以歸經用四物湯佛手散

治血而血止者血得補而歸經也蓋血最難歸經何以四物佛手偏能取效正因其血逆之輕耳逆輕者氣逆之小也逆重者氣逆之大也以四逆湯佛手散治血而血安雖亦取效終必得效之遲不若補血湯治氣而血止得效之捷也○或問黃芪補氣初治脹滿而少頃安然者何也此氣虛見補反作不受也黃芪補氣之虛而胃中之望補者更甚于別臟腑黃芪一入胃中唯恐有奪其補者乃閉關而不肯吐此脹滿所以由生也治之法用黃芪不可單用增入歸芎

麥冬三味使之分散于上下之間自無脹滿之憂矣  
故服黃芪脹滿有二症二不能受而一過于受也過  
于受者服下脹而少頃寬不能受者初脹輕而久反  
重以此辨之最易別耳○或問黃芪補氣聖藥宜乎  
凡氣虛者俱可補之矣何喘滿之病反不用者恐其  
助滿而增脹也先生既明陰陽之道深知虛實之宜  
必有以教我曰黃芪補氣而不可治脹滿者非黃  
芪之故不善用黃芪之故也夫大喘大滿乃腎氣欲  
絕奔騰而上升似乎氣之有餘實足氣之不足古人



用人參大劑治之者以人參不能助脹而善能定喘耳用之實宜然天下貧人多而富人少安得多備人參救急哉古人所以用黃芪代之而喘滿增劇遂不敢復用且誌之書曰喘滿不可用黃芪因自悞而不人傳不敢隱也黃芪用防風之汁炒而用之再不增脹滿但制之實有法防風用少則力薄不能制黃芪用多則味厚又嫌過制黃芪不唯不能補氣反有散氣之憂大約黃芪用一觔防風一兩先將防風用水

十碗煎數沸漉去防風之渣泡黃芪二刻濕透以火炒之乾再泡透又炒乾以汁乾爲度再用北五味三錢煎湯一大碗又炮半乾半濕復炒之火焙乾得地氣然後用之凡人參該用一兩者黃芪亦用一兩定喘如神而又不增添脹滿至妙之法亦至便之法也凡用黃芪但宜如此制之雖古人用黃芪加入防風治病亦能得效然其性尚未制伏終有跳祭之虞不若先制之爲宜彼此異忌而成功更神又何喘病之不可治哉

李巖評云用制黃芪以治喘者救貧寒之人也若富貴膏粱之子畢竟宜用人參

○或疑黃芪得防風其功更大用黃芪加入防風足矣而必先制而後用毋乃太好奇乎不知用黃芪而加防風之性與黃芪尚有彼此之分不若先制之調和其性情制伏其手足使之兩相親而兩相合絕不知有同異之分如異姓之兄弟勝于同胞相顧而收其全功也○或問黃芪補氣之虛止可補初起之虛而不可補久病之虛予問其故曰初虛之病用黃芪易受久虛之病用黃芪難受也嗟乎虛病用補宜新久之皆可受其不可受者非氣之虛乃氣之逆也氣

逆之虛必用人參而不可用黃芪在初虛氣逆之時  
卽忌黃芪矣何待久病而後不可用哉若氣雖虛而  
無逆則久病正宜黃芪未有不服之而安然者也誰  
謂黃芪之難受乎○或疑黃芪補氣何以必助之當  
歸以補血豈氣非血不生耶不知氣能生血而血不  
能生氣血不能生氣而補氣必補血者非取其助氣  
也益氣虛之人未有不血亦隨之而俱耗者也我大  
用黃芪以生氣則氣旺而血衰血不能配氣之有餘  
氣必至生火之不足反不得氣之益而轉得氣之害

矣故補氣必須補血之黃施也但因氣虛以補氣而復補其血則血旺而氣仍衰奈何不知血旺則氣不去生血故補血而氣自旺不必憂有偏勝之虞然多補其氣而少補其血則又調劑之甚宜也○或問黃芪何故須蜜炙豈生用非耶然瘡瘍之門偏用生黃芪亦有誤乎曰黃芪原不必蜜炙也世人謂黃芪炙則補而生則瀉其實生用未嘗不補也

本草新編

黃芪 臣曰甘平性微溫味甘無毒主虛損羸瘦

益氣長肉止寒熱療腎衰耳聾治癰疽久敗瘡排膿



止痛又治小兒百病婦人筋漏帶下諸疾○生原野

處處有之二月十月採根陰乾本草○治氣虛盜汗

自汗而皮表之藥又治咯血系脾胃是為中州之藥

又治傷寒尺脉不至補腎臟元氣為裏藥是上中下

內外三焦之藥也○入手少陽經足太陰經足少陰

命門之劑湯液○肥白人多汗者服之有功蒼黑人

氣實者不可服正傳○綿軟箭幹者佳瘡瘍生用肺

虛蜜水炒下虛鹽水炒用入門○莖葉療渴及筋

攣癰腫疽瘡本草  
東醫寶鑑

黃芪 百本 芟草 戴糝 百藥綿 蜀脂 獨

樵 戴樵 王孫 事物異名

黃耆 甘溫生用固表無汗能發有汗能止 丹溪云黃耆大

補陽虛自汗若表虛有邪發汗不出者服此又能自汗 溫分肉實腠理瀉陰火

解肌熱炙用補中益元氣溫三焦壯脾胃 脾胃一虛土不能生

金則肺氣先絕脾胃緩和則肺氣旺而肌表固實補中即所以固表也 生血生肌 氣能生血

血充則肉長 排膿內托瘡癰聖藥 毒氣化則成膿補氣故能內托癰疽

不能成膿者死不治毒氣 痘症不起陽虛無熱者宜

盛而元氣衰也痘症亦然 之新安汪機治痘症虛寒不起用四君子湯加黃耆

黃耆多效間有枯萎而死者自咎用藥之不精思

之至忘寢食忽悟曰白朮燥濕扶苓滲水宜痘漿之  
不行也乃減去二味加官桂糯米以助其力因名保  
元湯人參白朮茯苓甘草名四君子湯王好古曰黃  
耆實衛氣是表藥益脾胃是中州藥治傷寒尺脈不  
至補腎元是裏藥甄權謂其補腎者氣為水母也日  
華謂其止崩帶者氣盛則無陷下之憂也蒙筌曰補  
氣藥多補血藥亦從而補氣補血藥多補氣藥亦從  
而補血益氣湯雖如當歸因勢寡功彼參耆所據補  
血湯數倍于當歸亦從當歸所引而補血黃耆一兩  
當歸二錢名補血湯氣藥多而云補血者氣能生血  
又有當歸為引也○表旺者不宜用陰為補藥之長  
虛者宜少用恐升氣于表而裏愈虛矣  
故名耆代作皮黃肉白堅實者良入補中藥捷扁蜜  
灸達表生用或曰補腎及治崩帶淋濁宜鹽水浸炒  
耆使入腎也取其補中升氣則腎受蔭而帶濁崩淋  
自止即日華氣盛自無陷下之憂也有上病而下取

有下病而上取補彼經而茯苓爲使惡龜甲白鮮皮

益及此經者此類是也

畏防風東垣曰黃耆得防風其功益增訂本草大乃相畏而更以相使也

備要

凡遠行水火不便或修行人欲省緣休糧用黃耆赤

石脂龍骨各三錢防風半錢烏頭一錢炮於石臼內

搗一千杵煉蜜丸如彈子大要行遠路飽啣飯一頓

服一丸可行五百里二丸可行一千里○液歸心而

作汗斂之者黃耆六一

汗爲食物本草液會纂

黃耆稟天之陽氣地之冲氣氣薄味厚可外可降陽

也入肺脾胃經甘溫益元氣甘溫除大熱性能實表

於血補中皆陽生陰長之微妙也○在補中益氣湯  
爲治勞倦發熱之要劑○同生熟地黃黃蘗黃芩黃  
連當歸加炒棗仁爲治陰虛盜汗之正法去黃蘗黃  
芩黃連加人參五味子甘草治表虛自汗○同桂枝  
白芍防風炙甘草能實表治表虛畏風傷風自汗○與茅  
朮生地等分牛膝黃蘗減半作丸治積年溼毒腫瘡  
百藥不效○同白芷白及甘草金銀花皂角刺排膿  
止痛○同人參甘草治痘瘡陽虛無熱證○功能實  
表有表邪者勿用能助氣氣實者勿用能內塞補不



足胸膈氣閉悶腸胃有積滯者勿用能補陽陽盛陰  
虛者忌之上焦熱甚下焦虛寒者忌之病人多怒肝  
氣不和者勿服痘瘡血分熱盛者禁用

本草經疏  
輯要

戴糝

戴樵

芰草

百本

王孫

本草綱目黃

耆一名戴糝一名戴樵一名芰草一名百本一名王

孫又草與猴蟋蟀皆名王孫 百藥綿 清異錄侯

寧極藥譜百藥綿黃耆也

事物異  
名錄

耆支濁渠宜切音奇周禮八十曰耆釋名六十曰耆

耆指也不從力役指事使人也 字彙

耆渠宜切音奇說文耆老也曲禮六十曰耆指使釋  
名耆指也不從力役指事使人也○从老省旨聲老  
人喜耆味會意義作耆俗从老从日作耆非

正字通

耆廣韵渠脂切集韵韵會渠伊切正韵渠宜切並音

祁說文老也爾雅釋詁耆長也○耆字彙補同耆

康熙

字典

**原**黃耆

本草綱目云耆長也色黃爲百藥之  
長故名今俗通作芪或作耆者非

一名芰

草一名蜀脂一名百本一名獨樵一名戴樵一名戴

樛葉扶疎作羊齒狀似槐葉而微尖小又似蒺藜而

微潤大青白色開黃紫花大如槐花結小尖角長寸  
 許獨莖或作叢生枝幹去地二三寸根長二三尺以  
 緊實如箭籜者良味甘微溫無毒隴西者溫補白水  
 者冷補赤色者作膏消癰腫其皮折之如綿出綿上  
 故名綿黃耆綿上山有白水耆白水陝赤水耆赤水  
西沁州西同州  
 隴水耆功用並同而力不及白水耆木耆短而理橫  
 今人多以首蓿根假作者首蓿根堅而脆亦名土黃  
莖能令人瘦黃芪柔韌皮  
微黃褐色肉白  
能令人肥宜辨  
 元氣二也壯脾胃三也去肌熱四也排膿止痛活血

生血內托陰疽爲瘡家聖藥五也治氣虛盜汗自汗  
及膚痛是皮表之藥治咯血柔脾胃是中州之藥治  
傷寒尺脈不至補腎臟元氣乃上中下內外三焦之  
藥也苗嫩時亦可燂淘作茹食收其子十月種如種  
萊法彙考增梁書鄧至國傳國居西涼州界天監元  
年詔以鄧至象舒彭爲督西涼州諸軍事號安北將  
軍五年舒彭遣使獻黃耆四百斤馬四匹原本草衍  
義唐許胤宗初仕陳爲新蔡王外兵參軍時柳太后  
病風不能言脈沉而口噤胤宗曰旣不能下藥宜湯

氣蒸之藥入膝裏周時可瘥乃追黃耆防風湯數斛  
置於牀下氣如煙霧其夕便得語也集藻詩散句增  
金王特起但說今年秋雨多黃芪滿谷無人采別錄  
原製用凡使勿用木耆草形相似但葉短根橫綿耆  
則否須去頭上皺皮槌扁蜜水塗炙數次以透爲度  
廣羣芳譜

百藥綿

黃耆  
輟耕錄

芪唐韻

巨支切正韻渠宜切並音其黃芪藥名

康熙字典

黃耆

耆或作芪

和名也和羅久佐異名戴樛

經本

戴樛

別錄又名

本草

卷三

黃耆

三十四



獨茅草別錄又百本別錄王孫藥性增補異名黃芪綱目

編多証

黃耆 力ハラサケニ 薄鹽

黃耆味甘微溫主癰疽久敗瘡排膿止痛除肌肉中熱毒

大風癰疾去肌肉中風毒五痔鼠瘻去肌肉中濕毒補虛補脾胃之

虛小兒百病小兒當補後天黃耆甘淡而溫得

土之正味正性故其功專補脾胃味又微辛故能驅

脾胃中諸邪其皮最厚故亦能補皮肉為外科生肌

長肉之聖藥也神農本草經百種錄

耆ハ長也此草根ノ色黄ニメ充補藥ノ長タルヲ  
以テ黄耆ト名ク俗ニ黄芪黄耆ニ作ル者ハ俱ニ  
非也富士黄耆一種其形新ニ採タル年ハ能真ノ  
黄耆ニ似ト雖氏岐多メ年ヲ經則堅脆輕虛ニナ  
リテ如水甘味アルナシ此黄耆ニ非ス本綱ニ  
謂フ首端根俗呼土黄耆物ナリ

廣益本草  
大成

黄耆 綱目ニ又作黄芪○本草承曰出綿上者爲  
良故謂綿黄耆非謂其柔輒如綿○其製法考本草  
用蜜炙アリ鹽水ニ浸メ乾シ炙ルアリ李中梓曰

古人制黃耆多用蜜炙愚易以酒炙既助其達表又行其泥滯也若補腎及崩帶淋濁藥中須鹽水炒之  
○今案心腹ニ泥滯シ氣ヲ塞クニハ酒ニ浸シ焙  
リ或塩水ニ浸シ焙ルヘシ蜜炙泥滯ス大和本

黃耆 黃芪 戴椹 戴槿 芰草 王孫 百本

耆長也色黃爲諸藥之長故名倭名夜波良久佐本綱黃耆葉似槐葉而微

尖小又似蒺藜葉而微濶大青白色開黃紫花大如

槐花結小尖角長寸許根長二三尺以緊實如箭籐

者爲良嫩苗亦可煉淘茹食其子收之十月下種如

種萊法亦可有數種 白水黃芪 赤水黃芪 綿

黃芪 木黃芪 土黃芪 蓋白水赤水者共陝西

之鄉名綿者出於山西沁州綿上故名或云用其皮

折之柔韌如綿者爲良乃謂之綿黃芪木黃芪者短

而理橫今人多以苗落根假之俗呼爲土黃耆但堅

而脆味苦令人瘦黃耆柔而味甘令人肥大異用者

宜審水黃耆亦勿用氣味甘微溫氣薄味厚可外可降陰中

陽也人參補中黃耆實表藥中補益呼爲羊肉其用

有五補諸虛不足一益元氣二壯脾胃三去肌熱四

排膿止痛活血內托陰疽爲瘡家聖藥五也元氣弱

肥白而多汗者止之虛熱無汗則發之防風能制黃

耆黃耆得防風其功愈大乃相畏相使也伏苓爲之使惡龜甲

白鮮皮△按今藥肆不論出處好惡皆號綿黃芪售之

但擇取切口黃色柔靱者可用是亦經年者爲堅實

而不佳故新渡者良又出於倭者名富士黃耆經久

則堅脆味亦不甘疑此首蓿根矣不堪用故令售者下二

禁止也倭漢三才圖會

黃耆葉ハ小藤ノ葉ノコトク草立ハ二三尺マデ



ノボル夏ノコロヨリツホミ出テ藤ノ花ノゴト  
ク成ウスアタキ花サク實ハサ、ゲノゴトク成  
ル物一所ニ付ク

廣益地  
錦抄

黄耆

ゴマメヅル

名物  
録

黄耆釋名時珍曰耆長也黄耆色黄爲補藥之長故  
名今俗通作黄芪或作耆者非矣修治去蘆頭剉炙  
用或以蜜水塗炙用或以鹽湯浸焙用各隨本方味  
甘柔軟如綿者佳今日本富士黄耆者味苦不知苗  
精根歟氣味甘微溫無毒能入肺脾二經扶本爲使

補肺氣而實皮毛、斂汗、止癢、解渴、定喘、益胃氣而去  
膚熱、止瀉、生肌、補虛、治勞、理大風、癩疾、治帶下、崩淋、  
毒、惡、龜、甲、白、鮮、皮、肥、白、而、多、汗、者、爲、宜、若、面、黑、形、實  
而瘦者服之、令人胸滿、表有邪氣、方實者勿用、修治  
本書ノ如シ唐和氏ニアレ氏唐ヲ上トス綿黃耆  
ト云ハ形和カニメ綿絮ノ如キヲ以テ名クト云  
ハ附會ノ說ナリ綿州ノ産ヲ上トスル故ナリ和  
ニ二種アレ氏下品ナリ隨分新キヲ撰ビ用ベシ  
刻ンテ半年ニナレハ中ガウツロニナルモノゾ

富士黄耆ナド、云アレト兎角黄耆麥門冬牛膝  
ノ類ハ自然生ハクサミガアリテアシ、畑ニコ  
ヤシヲシテ作りタルガヨシ〔能〕本書ノ如シ扱テ此  
茶ハ氣ヲ補フトアリ勿論甘温ノ茶ナレバ補氣  
ノ茶ニ於テハ人參ト相ツ、キ上品ノ茶ナレト  
人參ノ元氣ヲ無何有ノ郷ニ還スト云ヤウニ功  
ハナイモノ人參ニハ各別オトリタルモノナリ  
元來ナイ所ノ元氣ヲ生スルホドナフハナラヌ  
モノ人參ハナイ元氣ヲアラスルモノ黄耆ソレ

ホドナ功ハナイモノナリ人參トナラベテツカ  
 ヘバナイ然レ先氣ヲ生ズル黄耆バカリハナ  
 シテ使ヘハ甘温ノモノナレバ脾胃ヲ補フモ  
 アルハツナレ此一味ヲ以テ參朮トナラベ用  
 ルヤウニハナイモノダ血茶ニテハ當飯ト同シ  
 意ナリ當飯ト云モノガアル血ヲ行ス<sup>ハナ</sup>ハナル  
 モノ無イ血ヲ生スル<sup>ハナ</sup>タヌモノ氣血ト云  
 モノハ滯レハ自然ト<sup>ハナ</sup>行レハ自然ト生  
 ズルモノユヘニナルホド肺脾ヲ補フ茶ナレ

人參ノ補トハ遙ニ違チカフタモノナリ仲景ノ建中湯  
ヲ組ル、ニ小建中湯デ建中ノ功ハ立ツソレニ  
黃耆ヲ加ヘテ黃耆建中湯ト爲セラル、ハ元氣ヲ  
表ヘ發達シテ表ヲ補フモノ故ニ自汗ヲ目當ト  
セラレタモノナリ兎角此茶ハ元氣ヲ補フハ  
補ヘ氏補フ功ヨリハ元氣外ヘ發達スル功が專  
ハラナリト意得ベシソレデ自汗盜汗癰疽ノ類  
凡テ表ニアツカレノ病ニ專ラ用ル也又血虛發  
熱ニ黃耆當飯ノニ味ヲ用テ當飯補血湯トスル



モ氣血ヲ補フナリニ行スル合点ナリ元氣甚タ  
虚シタモノニハ參耆并べ用井子バナラヌ千金  
方ニ黃耆建中湯ニ人參ヲ加テアリ扱黃耆ハ命  
門ニ達スルト云フアリ惣シテ地中へ深ク根ザ  
スモノハ皆下焦へ達スルモノナリ牛房山ノ芋  
ノ類モ此ナリ大根モ下へ根ザスモノナレレ全  
体ガ下焦へトビカヌサキニコナレテシマウ甘  
草ナドガ黃耆ニ似タルモノナレレ皆横へ根バ  
リテ下へハユカヌソレデ中焦ノ葉ナリサレレ

コノ黄耆一味ヲ頼ンテ下焦ヲ補フ程ノヲハアルマジキゾ**毒**本書ノ如シ色黒ク瘦テ實症ナルモノニハ不可用トアレヒ此モ病ニノゾンデイカフ虚スレハ用井子バナラヌ不可拘たづな扱無汗モノニ黄耆ヲ不可用ト云ヘヒ元氣虚衰ノ人寒ニ感レ無汗ニ發汗ノ茶ヲ用井テスキト汗ナイニ却テ黄耆建中湯ヲ用テ汗ノ心ヨク出ルヲアリ兼テ意得知ルベシ

片玉六八本草

黄耆試効療痘瘡内托助發行津癰疽久敗瘡排膿

撰修凡撰黃耆以色黃白味甜美柔韌如綿而新者  
爲佳用時水洗判細凡蒸法及蜜水塗炙鹽湯潤蒸  
等制皆不可用本艸云多以苜蓿根假作亂真但苜  
蓿根味苦而堅脆須謹審擇勿混用似是物此邦所  
產黃耆有二種一種叢生莖軟如蔓甚易繁茂葉似  
槐葉而圓小開淡黃花結小尖角根甚長但其根生  
雖甚甘而乾後苦不堪使後來若得種藝法不必用  
肥糞根生甘味或可用耳一種獨莖直上莖硬莖葉  
俱有毛茸餘皆同于叢生者俗稱富嶽黃耆以其初

得於富穢也疑是本艸綱目中蘓頌雷斅所說水耆也辨正世醫惑本艸之說凡逢虛人必用黃耆反招胸膈飽悶妨食之害殊不知逢時之人腹裏多結疝瘕故惡甜味者比比而有縱使黃耆有補虛之實功不償害莫足尚哉但小兒痘瘡稍見虛候者則可用○按李時珍曰今俗通作黃芪或作耆者非矣耆乃耆龜之耆音尸又芪作芪者益非也

一本堂藥選

黃芪 和漢共二有之漢ヲ上トスノ綿黃芪ト云ハ形チ軟ニレテ綿實ノ如キヲ以テ名ク綿州

ニ産スルカ故ニ名クト云ハ誤レリ猶大戟之例  
 和ニ二種アリ一種北國ニ生スルモノハ莖葉堅  
 メ似木葉ニ有毛此下品ナリ不堪用此本草所謂  
 木黃芪ナリ又羊齒葉ノ者アリ出于關東共木黃  
 芪ナリ今人家茶園等ニ此二種共多種之真種ア  
 ルヲ知ラス綿黃芪ハ莖葉軟弱味甘ク根長シ  
 色帶黃京都北山中間有之東國ニ是ヲワタ黃芪  
 ト呼フ合漢名知用藥須

黃耆 和名 ヤハラクサ 本草ノ頌カ説ニ合



スル者信州戸隠山ニ出ス其高サ二三尺葉ハ苦  
參ニ異夏ナシ夏月ニ至リ梢ニ花ノ穂ヲ出ス是  
モ苦參ニ相同シ後子莢ヲ結フ莢ノ長サ三五寸  
中ニ細子アリ是ヲ蒔ケハ能生ス其根大ナルハ  
三五尺ニ至ル是ヲ漢來ニ比スル本邦ノ産ニ勝  
レリ可入藥用

本草花  
蒔繪

黃芪 洛陽北山ニ産ス形ハキニ似タリ赤小豆  
ノ莢ニ似テ花黃色ニメ全体青葉付ノ処紫色ニ  
メ脆ク長伸タルハ余草ニモタレカ、ルモノナ

リ見又ニ夕キモナリ根長サニ尺ホドニメ味  
甘シコレヲ植ルニハ實ウエニメ能繁榮スルナ  
リ洛陽水舟ノ邊ニアリ卽綿黃芪ナリ富士又有  
之常ニ用唐ノ黃芪ナリ和ノ黃芪ハ苦キ故ニ不  
用又朝鮮黃芪ハ不可ナリ

本草會  
誌

水黃芪 洛之御藥苑所植者與江州及越前州所  
產者同種也葉有澁毛根極堅實者是也又一種本  
草綱目百脉根卽與孟說曰苜蓿根作土黃芪者同  
物而是古之水黃芪也證類本草所說水黃芪亦指

此耳然則木黃芪首蓐百脉根同一種而後徒生分別也而李時珍所說首蓐別是一種菜屬而非古人所謂首蓐也讀者宜識別而無疑惑耳

本草一家言

照任曰駿州富士山中ヨリ黃芪ヲ出ス二種アリ此葉甘キモノハ其根好カラス其葉苦キモノハ其根甚タ宜シク味甘ク柔カニシテ綿ノ如シ即チ獻上ス○先生按スルニ照任イヘル如ク柔ニシテ味甘キヲ用ユベシ甲州其外北國所々ヨリ出ル綿黃芪小黃芪木黃芪ノ三種アリ京師叡山

加茂貴布祢ノ邊ニモ生ヌ又越前ヨリモ産ヌ葉  
ハ萩ニ似テ毛アリ花ハ紫藤ノ花ノ如クウス青  
キ花サク實サ、ケニ似タリ羊齒葉ノ黃芪別ニ  
江東ニアリ真ノ黃耆ハ稀ナリ多クハ水黃耆ナ

リ撰ヒ用ヌシ株藥使記

黃耆 種甚多シ此條トク、コロ實ニシタル説  
ニ非ス綿ト云ハ地名ニナシタリ此説非ナリ其  
皮綿ノコトシト云説ヨシ水綿ニ對テ云ト知ル  
ヘシ羊齒葉ト槐葉トハ別ナリ槐葉ニモ二種アリ

リ此書數種ヲ混セノ羊齒葉ト疾藨葉トハ同種  
也疾藨葉ノ中ニ葉ノホソキモノ上品ナリ闊黃  
紫花ト云ハイカ、ナリ白キヲ黃ト云紫ヲ白ト  
云ハヨシ黃ニシテ紫ナルハ大方ナキモノナリ  
槐葉ハ黃花ナリ疾藨葉紫花ナリ紅槐花ト云不  
審也誤字乎角實ニ黃ハ短ニメ四角ニ穗ヲナシ  
アツマリ結フ紫ハ苜蓿ノ如ク豆ニ似タリ出  
綿上呼爲綿黃存今處々有之根長二三尺獨莖叢  
生枝幹其葉扶疎作羊齒狀似槐葉微大又似疾



藜葉闊大而青白色開黃紫花如槐花結小尖角長

寸許味甘救荒本草  
臆斷

黃耆 本草綿黃耆白水耆赤水耆水耆等ノ數種

アリ按ズルニ白水赤水ノ二種ハ所出ノ地名ヲ

以テ名ク綿黃耆ハ蘇頌曰其皮折之如綿謂之綿

黃耆陳承曰出綿上者爲良故名綿黃耆非謂其系

韌如綿也松岡先生綿大戟ノ例ヲ以テ頌力説ヲ

優レリトス今從之木耆ハ堅剛ニメ木ノゴトク

ナルヲ以テ名ク本邦數種アリ△綿黃耆 根系

ニメ味甘キモノ上品ナリ藥肆鐵椎ヲ以テ水黃  
耆ヲ打テ綿ノ如クナルモノアリ用ベカラズ○  
豐後産上品莖葉苦參ノコドク特生ス五六月淡  
黃花ヲ開ク狀槐花ノゴトシ花謝メ後短小角ヲ  
結フ根直ニ土ニ入リ二三尺皮赤色ニメ甘草ニ  
似タリ肉白柔靱ニメ綿ノゴトク味甘シ丁丑主  
品中田村先生具之○下野日光山産上品莖葉大  
抵豐後産ニ同シ豐後産ニ比スレバ幹弱ク叢生  
メ去地數寸根柔ニメ味甘シ○信濃戸隱山地藏

谷產至テ上品ナリ其形大抵日光ノ產ニ同シ花  
淡黃色又紫花ノモノアリ實狀翹搖子ニ似テ長  
寸許ニメ扁ナリ根柔ニ味甘メ餘味アリ大サ一  
虎口ノモノアリ同國善光寺青山仲菴是ヲ得タ  
リ壬午客品中具之△木黃耆 富士山產蔓延ス  
ルヲ翹搖ノゴトク花淡黃色又紫花ノモノアリ  
根ハ横ニ延ブ雷斃曰凡使勿用水耆草真相似只  
是生時葉短并根横也ト云モノ是ナリ根堅實ニ  
メ味苦瀋葉ハ味甘シ豐後產根甘メ葉苦モノト

相反ス○讃岐阿野郡川東山中産富士山ノモノ  
ト同種ナリ○日光又一種ヲ産ス特生スルト豊  
後ノ産ニ似タリ根堅メ味苦瀟ナリ以上三種皆  
下品ニメ不堪藥用（舊）物類品

黄耆

ワウキ

通名

一名百藥綿

輟耕錄

綿耆

本草原始

甘板麻

採取月令

黄耆

華陀内照圖

羊肉

發明

綿水

ノ分チアリ根硬キ者ヲ水黄耆トシ根軟ニメ綿  
ノ如キ者ヲ綿黄耆トス上品ナリ綿ノ字ハ柔軟  
ニメ綿ノ如キヲ云綿大戟綿地榆ノ例ノ如シ陳

承ハ綿上ニ生スルヲ上品ト爲ト云地名トス是  
ニ非ス京師北山中ニ生スル者ハ葉ノ形槐葉ニ  
似テ莖柔弱直上スルヲ能ハズ地ニ偃々藤蔓ノ  
如シ夏月葉間ニ花ヲ生ス淺黃色他州ニハ淡紫  
色ナルモアリ形豆花ノ如クニメ小ク數系穗ヲ  
ナス後角ヲ結ブ小豆角ヨリ狹細中ニ一隔アリ  
子其内ニ滿形至テ小ク淡褐色ナリ秋後苗枯春  
ニ至リ舊根ヨリ叢生ス葉味甘ク根味微苦ニメ  
硬シ是水耆ナリ豊後下野信濃ニ産スル者ハ葉



味苦ク根味甘クメ柔軟ナリト云然レモ未ダ肆  
中ニ出ズ其加州白山和州金剛山駿州富士山上  
ニ生スル者形狀皆同シ富士山麓ニ生スル小葉  
紫碧花ナル者ハ別種也黄耆ニ非ス 廣島種近  
來傳ヘ裁花戸ニ誤テ唐種ト云春蒿根ヨリ苗ヲ  
叢生ス莖幹直上シ高サ三四尺苦參ノ形ニ似タ  
リ圓ニノ毛アリ葉ハ槐葉<sup>エンビユ</sup>ニ似テ微狭ク又苦參<sup>クヲハ</sup>  
葉ニ似テ毛アリ淡綠色夏月稍葉間ニ花ヲ開ク  
黃白色形<sup>ワキ</sup>豆花ニ似タリ後短莢ヲ結ブ秋深テ

苗枯 藥舖ニ販ク者漢渡ハ形纖長ニ尺許箭篠<sup>ヤガラ</sup>  
ノ如シ柔軟ニメ味甘シ市人皮ヲ去水賊<sup>トリヤ</sup>ヲ以テ  
磨キ白クメ賣肉白クメ心ハ黃ナリ又心白キ者  
アリ是綿黃耆ニメ上品ナリ然レ氏舶來時ニヨ  
リ善惡アリ朝鮮ヨリ來ル者ハ味微苦シ良ナラ  
ス和産ハ加州白山越州立山和州金剛山ヨリ出  
ス者根柔ニメ味甘シ用ユベシ富士黃耆ハ根硬  
シ下品ナリ今廣島種ヲ河州和州ニ栽テ大坂ノ  
藥舖ニ出ス偽テ唐種ノ黃耆ト云根柔軟ニメ白

肉黃心舶來ノ者ニ異ナラズ味甘厚上品ナリ

本草

綱目啓蒙

黃耆

ヤハラクサ

鞍馬貴船山中及ヒ近道諸

山ニ間有之二月苗ヲ生ス葉槐モウ及ヒ甘草ノ葉ニ

似タリ四五月花ヲ着ク黃白紅紫ノ四種アリ

モ紅緑ノ異アリ花落テ莢ヱヤヲ結フ子能ク生ス三

五年ニナルモノ藥用ニ充ルニ足レリ花景

黃耆

戴椹

ヤハラグサ

唐色黃白ク味甘ク

ヤワラカナルヲ綿ワウギト稱ス尤上品ナリ朝

黃耆

鮮ハカタク太シ和ハ至テ色白シ用ルニタエズ

○黄孫 ワウギナリ ○百本 ワウギナリ ○綿

黄耆 ワウギノ上品 ○水耆 ワウギナリ ○百

藥綿 ワウギナリ ○王孫 ワウギナリ又サル

ナリ ○戴椽 戴粉 戴槌 ワウギナリ ○羊肉

ワウギナリ ○芟草 ワウギナリ ○土黄耆

ワウギナリ ○蜀脂 ワウギナリ ○獨槌 ワウ

ギナリ ○白水耆 ワウギナリ ○赤水耆 ワウ

ギナリ 藥品手

引草

黄耆

和名ヤワラクサ

本草和名

ワウギ 通名

按

ニ綿黄耆ハ廣島種ノモノニメ莖特生直立ス葉ハ槐葉ニ似テ軟ニメ花白色根大ナル物圍リ二三寸長サ三尺一及フ外皮黄色肉白色ニメ軟ナリ根味淡甘葉味微苦一種富士山ニ産スルモノハ蔓生ニメ莖地ニハフ花淡黄色根味淡甘ニメ硬シ廣島黄耆ヲ和蘭ニテアストラカリユスト云味ヤ、苦ク肉味甘シ下痢ヲ止メ小便ヲ通ス鼻ニサシテ衄血ヲ止甘草ニ代用ス饑ト渴ヲ止



ト云又一種紫花ニメ苗稍小ニメ葉モ又小ニメ

厚シ根細メ黄色葉味淡甘ナリ槐ハエシユ疾

菊ハハマヒシナリ救荒本草  
通解

黄耆 一名羊肉發明綿耆本草  
原志 和名ヤハラクサ

本草  
和名 タシチサムブルハイ東醫  
寶鑑

變名アスト

ラカリユス和蘭 綿黄耆水黄耆ノ二種アリ綿黄

耆ハ藝州廣島ヨリ出ツ宿根ヨリ生ス莖直立メ

蔓ヲナサズ葉ハ槐葉ニ似テ軟ナリ夏月莖高サ

三尺許梢ノ葉間ニ二三寸ノ穗ヲ生メ小豆花ノ

如ク黄白色ノ花ヲ連生シ後莢ヲ結フ莢中空ニ  
メ漸小子アリ根大ナルハ小兒ノ臂ノ如ク小ナ  
ル母指ノ如ク長サ二三尺皮黄赤色肉黄白色味  
淡甘葉味微苦シ根軟ニメ綿ノ如シコレ縮黄耆  
ニメ上品ナリコレヲ喝蘭ニテ下痢ヲ止小便ヲ  
通ス鼻ニ挿テ衄血ヲ止メ甘草ニ代用ス饑ト渴  
ヲ止ムト云平賀鳩溪云豊後ノ産ハ特生ニテ上  
品綿耆也ト云コレ廣嶋種ト同物ナルベシ古ヨ  
リ富士山中ニ生スル蔓生ノ黄耆ヲ上トスレト

廣嶋種ニ比スベカラズソノ富士黄耆ハ葉大ニ  
メ槐葉ノ如ク地ニ搦シ花黄白色又紫花モア  
リ根白色ニメ硬ク味淡シコレ本黄耆ナリ藥店  
ニテコレヲ真ノ黄耆トスルハ非ナリ又大坂ニ  
テ漢種ノ黄耆ト称メ栽ルモノアリコレハ和名  
クサハキニテ救荒本草ノ草零陵香ナリ黄耆ノ  
類ニ非ス蘭山云加州白山越州立山和州金剛山  
ヨリ出スモノ根柔ニメ味甘シ用ユヘシ

本草穿

黄耆

ヤハラクサ

和本草

綿黄耆ハ藝州廣嶋ヨ

リ出ルトイフ莖直立ス葉ハ槐ニ似テ軟ニシテ  
毛茸アリ莖高サ三四尺秋花アリ形胡枝花ニ似  
テ淡黄色從テ莢ヲ結フ角中空虛ニシテ漸小予  
アリ根大ナルハ小兒ノ擘ノ如ク肉黄白色コレ  
ヲ折ルニ甚柔軟ナリ此物上品ニメ味甘シ○フ  
ジワウギ 駿州富士山中ニアリ莖蔓ノ如ク微  
白色ニメ硬ク味淡シ淡黄ノ花ヲ開キ角ヲ結フ  
一種紫花ノ物アリ苗根ミナ小ナリ二種トモニ  
水黄耆ニシテ下品ナリ本草圖譜

カハラサハケ  
加波良佐々介

黄耆  
本草和名

マハラダサ  
夜波良久佐

黄耆

和名抄

○フジワウギ

黄耆一種富士山麓ヨリ  
出ス新根系軟ナレ氏旧

根ハ堅シ実味苦メ下品ニ

○ワタワウギ

綿黄耆

茶店富士甘草ト云誤ル

黄耆集解和産(大和金剛山)ニ自生ス是ヲ取リ圍  
ニ培養メコンゴウセント云藥用ニ佳ナリ又(和

州漢種ヲ出ス黄耆ニ似テ莖葉  
皆白毛有此根舶来ニ次ク上品  
考和訓抄  
本草藥名備

黄耆 莖葉苦參ノ如ニ特生ノ五六月淡黄花ヲ

開槐花ノ如シ花后短角兒ヲ結フ蔓生ノモノ工

ントウノ如クニノ葉コマカニ花淡黄色ニノ葉

間ニ簇生ス又小蔓ヲ引葉甚コマカニノ葉間葉



花穂ヲナス者アリ富士ニ産ス從テ根硬柔アリ  
根甘ク肉白柔ニメ綿ノ如キヲ上品トス所謂綿  
黄耆也堅實ニメ味苦ヲ下品トス水黄耆也頌說  
ノ綿ハ形狀也承說ハ地名也松岡氏頌說マサレ  
リト云今藝家特生ヲ水トシ蔓生ヲ綿トメ通用  
ス必モシカラス平賀氏云豊後産特生ニメ上品  
綿耆也富士ノ産蔓生ニメ下品水耆也百花天  
工區別  
黄耆 本草和名云夜和良具左系草之義蘇頌云  
折之如綿蓋本于  
此陳藏云出綿  
上据此說則非花師云綿ワタ藤舶渡存皮者佳吳氏從

新云形如箭簪者佳名箭簪綿軟而嫩無丫枝故名又

香切片外白中黃金井玉蘭和產稍劣然曩時官

藥料信濃戶隱山產也加賀白山產者頗可足以補

其闕歟近來河內金剛山駿河富士山甲斐富士山

武藏處澤此地近村農夫蒸候農隙採藥以為業其土人湊出東都原非產於處澤也下條記

處澤者皆破之安藝大和越後出之按此草有二種一莖軟

而搗生根苦不堪用一特生俗云富士黃耆肆上云

圓剪黃耆即是也近見蝦夷產甚肥大然其性味薄

劣矣本草綱目纂疏

黄耆 通名 綿木ノ二種アリ根硬キ者ハ木黄

耆ニシテ下品ナリ根柔軟綿ノ如キ者ハ綿黄耆

ニシテ上品ナリ綿大戟 綿地榆ノ例ナリ然ル

ニ本草黄耆條陳承説云出綿上者爲良ト云ハ地

名ニシテ是ニ非ス舶來柔軟ニシテ綿ノ如キ者

上品ナリ本邦諸所ニ産スレド木黄耆多シ藝州

廣嶋産ナル者アリ綿黄耆ニシテ舶來ニ同シ近來

唐種ナリト誤リ称ス春蒿根ヨリ苗叢生ス莖幹

直上高サ三四尺莖葉共ニ苦參ニ似テ毛茸アリ

淡綠色夏月梢ノ葉間ニ花ヲ開ク黃白色形亦小

豆花<sup>ツキ</sup>ノ如シ後短莢ヲ結ブ秋深シテ苗枯ル救荒本草

啓蒙

〔增〕本草從新云外白中黃金井玉欄堅實肥大而嫩

者最良〔發明〕三拗湯 醫學入門釋方云拗不順也

言甘草不炙麻黃留節杏仁不去皮尖故曰三拗重

本草綱目  
啓蒙

ワウギ ヤワラクサ 黃耆 蔓生ノモノヲモ 物品識  
メ ン ズ ル ト 云 拾遺

黃耆 百藥綿 根柔ナルユヘニ綿黃耆ト云藝

州廣島ヨリ産スルモノ特生ニシテ上品ナリ特

生ハ葉味苦ク根甘シ富士黄耆ハ蔓生ニシテ葉

甘ク根微ク苦シ真黄耆ニアラズ長丸切

朝鮮

真丸切

富士黄耆

白山

加州白山ノ産也上品トス

手板發

蒙

瓜子金

水黄耆ヤワラクサ

苗初摺地生後分莖蔓四五月開

花結角邦俗或充綿黄耆何如辨其枝葉土名瓜

子金根名烏根籐其性用同風不動石南藤各瘋藥

等今此味甘氣腥係是温補之性亦地道之稍別也



辛丑宋宜 觀林大明 所謂綿黃耆者以皮折之如綿故謂之

綿黃耆此種乃是水芪生時葉短根橫凡使勿用


癸卯

石家辰潘質問本

貞蔚耳客草

水草通串卷二

本草通串卷三



富山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

人參

人參味甘微寒主補五藏安神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服輕身延年一名人街一名

鬼盖

神農本草經  
大觀本草

本草曰人參味甘微寒生山谷主補五藏安精神魂魄除邪止驚明目開心益智久服輕身延年生上黨

神農本草經  
太平御覽

人參

釋名人街

經本

鬼蓋

經本

根主治

補五臟安精神

定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服輕身延

年

神農本草經  
綱目

人參味甘微寒主補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服輕身延年人街鬼蓋

神農本草經  
盧復手錄

人參味甘微寒主補五藏安精神定魂魄止驚悸除

邪氣明目開心益智久服輕身延年一名人衙一名

鬼蓋生山谷

神農本草經  
孫星衍

人參味甘微寒微溫無毒主補五臟安精神定魂魄

止驚悸除邪氣明目開心益智療腸胃中冷心腹鼓

痛胸脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脈破堅積

令人不忘久服輕身延年

神農本草經疏  
吳懷祖輯要

人參味甘微寒主補五藏安精神定魂魄止驚悸除

邪氣明目開心益智久服輕身延年

神農本草經  
百種錄

人參 微溫無毒療腸胃中冷心痛鼓痛腎脇逆滿

霍亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人忘一名

神草一名人微一名土精一名血參如人形者有神

生上黨山谷及遼東二月八月上旬採根竹刀刮暴

乾無令見風

名醫別錄  
大觀本草

人參

釋名

血參

別錄

神草

別錄

土精

別錄

集解 別錄曰人參

生上黨山谷及遼東二月四月八月上旬采根竹刀

刮暴乾無令見風根如人形者有神根氣味別錄曰

微溫

名醫別錄  
本草綱目



蔓人蔓藥艸出上黨从艸漫聲山林切

說文

地精人蔓

所今也廣雅

〔釋名〕地精

廣雅皺面還丹

廣雅○本草綱目

吳氏本草曰人參一名土精一名神草一名黃參一

名血參一名久微一名玉精神農甘小寒桐君雷公

苦岐伯黃帝甘無毒扁鵲有毒或生邯鄲三月生葉

小銳枝黑莖有毛三月九月採根根有頭足手面目

如人

吳普本草  
太平御覽

〔釋名〕黃參

吳普

〔集解〕普曰或生邯鄲三月生葉小銳枝

黑莖有毛三月九月采根根有手足面目如人者神

氣味普曰神農小寒桐君雷公黃帝岐伯甘無毒吳普

本草○本草綱目

潛夫論曰夫理世不得真賢譬猶疾不得真藥也疾

當得真人參反得蘿菔已不識真而飲疾浸以劇不

知爲人所欺也王符潛夫論

石勒別傳曰初勒家園中生人參葩茂甚盛于時父

老相者皆云此胡體奇貌異有大志量其終不可知

勸邑人厚遇之石勒別傳

陶隱居云上黨郡在冀州西南今魏國所獻卽是形  
長而黃狀如防風多潤實而甘俗用不入服乃重百  
濟者形細而堅白氣味薄於上黨次用高麗高麗卽  
是遼東形大而虛軟不及百濟百濟今臣屬高麗高  
麗所獻蕪有兩種止應擇取之爾實用並不及上黨  
者其爲藥切要亦與甘草同功而易蛀

音注 蚱 音仲

唯內器中密封頭可經年不壞人參生一莖直上四  
五相對生花紫色高麗人作人參讚曰三桮五葉背  
陽向陰欲來求我掇

音賈

樹相尋掇樹葉似桐甚大

陰廣則多生陰地採作甚有法今近山亦有但作之

不好

神農本草陶弘景  
註○大觀本草

〔集解〕弘景曰上黨在冀州西南今來者形長而黃狀如防風多潤實而甘俗乃重百濟者形細而堅白氣味薄於上黨者次用高麗者高麗卽是遼東形大而虛軟不及百濟並不及上黨其草一莖直上四五相對生花紫色高麗人作人參讚云三桠五葉背陽白陰欲來求我掇樹相尋掇音賈樹似桐甚大陰廣則多生來作甚有法今近山亦有但作之不好〔修治〕弘

景曰人參易蛀艸唯納新器中密封可經年不壞發

明弘景曰人參爲藥切要與甘草同功

神農本草陶弘景註。本

草綱目

陶隱居百一方云霍亂餘藥乃可難求而治中丸四  
順厚朴諸湯不可暫闕常須預合每至秋月常齎自  
隨唐石公上方慶云治中丸以下四方不惟霍亂可  
醫至於諸病皆療並須豫排比也其三方者治中湯  
四順湯厚朴湯也四順湯用人參附子炮乾薑甘草  
各二兩切以水六升煎取二升半分四服若下不止



加龍骨二兩若痛加當歸二兩厚朴湯見厚朴條一百

方大  
觀本草

治卒上氣喘急鳴息便欲絕人參末服方寸匕日五

六服肘後方○  
大觀本草

治大人小兒不進乳食和氣去痰人參四兩半夏一

兩生薑汁熬一宿曝乾爲末麪糊爲丸如棗豆大每

服十丸食後生薑湯吞下又方治狗咬破傷風以人

參不計多少桑柴火上燒令煙絕用盞子合研爲末

糝在瘡上立效經驗後方○  
大觀本草

春秋運斗樞曰搖光星散爲人參癢江淮山瀆之利

則搖光不明人參不生

春秋運斗樞

禮斗威儀曰君乘木而王有人參生

禮斗威儀

雷公云凡使要肥大塊如雞腿并似人形者採得陰

乾去四邊蘆頭并黑剉入藥中夏中少使發心疰之

患也

炮炙論  
大觀本草

〔正誤〕數云夏月少使人參發心疰之患

炮炙論  
本草綱目

茯苓爲之使惡洩疏反藜蘆又云馬蘭爲使惡鹵鹹

藥對○大  
觀本草

〔氣味〕之才云伏苓馬藺爲之使惡溲疏鹵鹹反藜蘆

一云畏五靈脂惡皂莢黑豆動紫石英

藥對○本草綱目

藥性論云人參惡鹵鹹生上黨郡人形者上次出海  
東新羅國又出渤海主五藏氣不足五勞七傷虛損  
痰弱吐逆不下食止霍亂煩悶嘔噦補五藏六腑保  
中守神又云馬藺爲之使消腎中痰主肺萎吐膿及  
癰疾冷氣逆上傷寒不下食患人虛而多夢紛紜加  
而用之

藥性論○大觀本草

〔主治〕主五勞七傷虛損痰弱止嘔噦補五臟六腑保

中守神消胸中痰治肺痿及癰疾冷氣逆上傷寒不下食凡虛而多夢紛紜者加之

藥性論  
本草綱目

唐本注云陶說人參苗乃是薺危桔梗不悞高麗讚也今潞州平州澤州易州檀州冀州幽州嬀州並出蓋以其山連亘相接故皆有之也

今注人參見用多

高麗百濟者潞州太行山所出謂之紫團參亦用焉

陶云俗用不入非也

唐本注  
大觀本草

**集解**恭曰人參見用多是高麗百濟者潞州太行紫

團山所出者謂之紫團參

唐本注  
本草綱目

開心肥健人人參一分豬肪十分酒拌和服一百日  
百日滿體髓溢日誦千言肌膚潤澤去熱風痰

千金方

海藥云出新羅國所貢又有手脚狀如人形長尺餘  
以杉木夾定紅線纏飾之味甘微溫主腹腰消食補  
養藏腑益氣安神止嘔逆平脉下痰止煩燥變酸水  
又有沙州參短小不堪採根用時去其蘆頭不去者  
吐人慎之

海藥本草  
大觀本草

**集解** 珣曰新羅國所貢者有手足狀如人形長尺餘  
以杉木夾定紅絲纏飭之又沙州參短小不堪用

**主**



治止煩躁變酸水

李海藥本草  
本藥綱目

蕭炳云人參和細辛密封經年不壞

四聲本草  
大觀本草

修治炳曰人參頻見風日則易蛀惟用盛過麻油瓦

罐泡淨焙乾入華陰細辛與參相間收之密封可留

經年一法用淋過竈灰晒乾罐收亦可

四聲本草  
本草綱目

高麗人參贊三極五葉背陽向陰欲求我椶樹相

尋椶木葉似桐甚大陰廣參多生其陰

續博物志

古多迹

一名加乃介久  
左又久乃以

味苦

微之

香之

三五月

開白小花

乎

八九月

尔

採根晒乾

矣

用

大同類  
聚方

人參

久乃乃伊又云新撰加乃尔介久佐字鏡

人參一名人衙一名鬼蓋一名神草一名人微一名

土精一名血參一名黃糸一名玉精

已上三名出叙藥性

人參

者藥精也

出范注方

一名人微

出雜要訣

和名加乃尔介久佐

一名尔已太一名久末乃以

本草和名

臣禹錫等按藥性論云人參惡鹵鹹生上黨郡人形

者上次出海東新羅國又出渤海主五藏氣不足五

勞七傷虛損痰弱吐逆不下食止霍亂煩悶嘔噦補

五藏六腑保中守神又云馬藺爲之使消胃中痰主

肺竅吐膿及癰疾冷氣逆上傷寒不下食患人虛而  
多夢紛紜加而用之

蜀本草掌禹錫  
按○大觀本草

元日御藥人參七兩三分○臘月御藥人參八兩○  
中宮臘月御藥人參八兩三分○東宮白散人參九  
兩二分○雜給料人參四斤七兩三分○齋宮寮人  
參十兩○左右近衛府人參十兩○左右兵衛府人  
參七兩三分○諸國進年料雜藥伊勢國人參二斤  
八兩○甲斐國人參四斤○陸奥國人參四十五斤  
○若狹國人參三斤○越前國人參十四斤○丹波

國人參二斤○美作國人參二斤○伊豫國人參九

斤

延喜式

人參本草云人參一名神草和名加乃仁介久佐一

名久末乃伊

和名類聚鈔

〔集解〕保昇曰今心州遼州澤州箕州平州易州檀州

幽州媯州并州並出人參蓋其山皆與太行連亘相

接故也

韓保昇重註  
○本草綱目

日華子云殺金石藥毒調中治氣消食開胃食之無

忌

日華本草  
大觀本草

主治消食開胃調中治氣殺金石藥毒

日華子大明  
本草綱目

日華子云治惡瘡疥癬及身痒排膿消腫毒

日華子  
大明

湯液  
本草

圖經曰人參生上黨山谷及遼東今河東諸州及秦  
山皆有之又有河北摧揚及閩中來者名新羅人參  
然俱不及上黨者佳其根形狀如防風而潤實春生  
苗多於深山中背陰近椶音漆下濕潤處初生小者  
三四寸許一椶五葉四五年後生兩椶五葉未有花  
莖至十年後生三椶年深者生四椶各五葉中心生



一莖俗名百尺杵三月四月有花細小如粟藥如絲  
紫白色秋後結子或七八枚如大豆生青熟紅自落  
根如人形者神二月四月八月上旬採根竹刮去上  
暴乾無令見風泰山出者葉蘄青根白殊別江淮出  
一種土人參葉如匙而小與桔梗相似苗長一二尺  
葉相對生生五七節根亦如桔梗而柔味極甘美秋  
生紫花又帶青色春秋採根不入藥本處人或用之  
相傳欲試上黨人參者當使二人同走一與人參舍  
之一不與度走三五里許其不舍人參者必大喘舍

者氣息自如者其人參乃真也李絳兵部手集方療  
反胃嘔吐無常粥飲入口卽吐困弱無力垂死者以  
上黨人參二大兩拍破水一大升煮取四合熱頓服  
日再煮以人參汁煮粥與噉李直方司勳徐郎中於  
漢南患反胃兩月餘諸方不差遂與此方當時便定  
差後十餘日發入京絳每與名醫特論此藥難可爲  
儔也又雜他藥而其效最著者張仲景治胃痺心中  
痞堅留氣結胃脘滿脅下逆氣搶心治中湯主之人  
參朮乾薑甘草各三兩四味以水八升煮取三升每

服一升日三如臍上築者爲腎氣動去朮加桂四兩  
吐多去朮加生薑三兩下多者復其朮悸者加茯苓  
二兩渴者加朮至四兩半腹痛者加人參至四兩半  
寒者加乾薑至四兩半滿者去朮加附子一枚服藥  
後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣被此方  
晉宋以後至唐名醫治心腹病者無不用之或作湯  
或蜜丸或加減皆奇效調治治霍亂謂之溫中湯

圖經

○大觀  
本草

〔集解〕頌曰今河東諸州及泰山皆有之又有河北攢

場及閩中來者名新羅人參俱不及上黨者佳春生  
苗多於深山背陰近椶漆下濕潤處初生小者三四  
寸許一極五葉四五年後生兩極五葉未有花莖至  
十年後生三極年深者生四極各五葉中心生一莖  
俗名百尺杵三月四月有花細小如粟蕊如絲紫白  
色秋後結子或七八枚如大豆生青熟紅自落根如  
人形者神泰山出者葉幹青根白殊別江淮間出一  
種土人參苗長一二尺葉如匙而小與桔梗相似相  
對生生五七節根亦如桔梗而柔味極甘美秋生紫

花又帶青色春秋採根土人或用之相傳欲試上黨  
參但使二人同走一舍人參一空口度走三五里許  
其不舍人參者必大喘舍者氣息自如其人參乃真

也

蘇頌圖經  
本草綱目

人參今之用者皆河北權場博易到盡是高麗所出  
率虛軟味薄不如潞州上黨者味厚體實用之有據  
土人得一窠則置於版上以色茸

元版  
茸作綠

纏繫根頗

纖長不與權場者相類根下垂有及一尺餘者或十

歧者其價與銀等稍爲難得

本草衍義  
丹波元  
胤訂正重雕  
宋本



行義曰人參今之用者皆河北擢場博易到盡是高麗所出率虛軟味薄不若潞州上黨者味厚體實用之有據土人得一窠則置於板上以色草纏繫根頗纖長不與擢場者相類根下無有及一尺餘者或十皮者其價與銀等稍爲難得

本草行義  
大觀本草○

**集解**宗奭曰上黨者根頗纖長根下無有及一尺餘者或十岐者其價與銀等稍爲難得土人得一窠則置板上以新絲絨飭之

本草行義  
本草綱目○

**本草行義**上黨參有長及一尺餘者或十岐者其價

與銀等稍爲難得土人得一窠則置板上以新絨飾

之

本草衍義  
廣群芳譜○

春秋運斗樞曰搖光星散爲人參廢江淮山瀆之利  
則搖光不明人參不生禮斗威儀曰君乘木而王有  
人參生說文云人蔘出上黨蔘即參也所以名爲人  
蔘者本草云如人形者有神范蠡計然亦曰狀類人  
者善說者曰出新羅國所貢有手脚狀如人形長尺  
餘或云生邯鄲者根有頭足手面目如人或曰生上黨者  
人形皆具能作兒啼說益侈則益誕大率生深山中

近椒漆下濕潤處椒似桐而多蔭故人參生其下高  
麗人作人參讚曰三桮五葉背陽向陰欲來求我椒  
音木相尋欲試上黨人參者當使二人同走一與人  
參含之度走三五里計其不含者必大喘含者氣息  
自如潛夫論曰治疾當得真人參返得蘿菔梁阮孝  
緒母疾須得上人參舊傳鍾山所出孝緒躬歷幽險  
見鹿前引就鹿滅處視之得此草傳子曰先王之制  
九州異賦天不養地不出君子不以爲禮若河內諸  
縣去北山絕而各調出御上黨真參上者十斤下者

五斤所調非所生民以患其潞州太行山所出者謂

之紫圖參

羅願爾雅異

人參曰人衙曰鬼蓋曰神草曰人微曰土精曰血參  
如人形者則神故多得人名朝鮮之人贊云三桎五  
葉背陽向陰欲來求我椶樹相尋

昆蟲草木略

人參許氏說文人蔓字與參同扁鵲云有毒或生耶  
耶三月生葉小花核黑莖有毛九月採根有頭足手  
面目如人春秋運斗樞云搖光星散爲人參廢江淮  
山瀆之利則搖光不明人參不生禮斗威儀云君乘

水而王有人參生廣雅云參地精人參也梁書阮孝  
緒母疾須人蔘舊傳鍾山所出有鹿引之鹿滅得此  
草異苑與廣五行記皆云土下有呼聲掘之得人參

如人形四體備具聲遂絕

姚寬西溪叢語

高麗地瘠惟產人參松子龍鬚布席白礮紙

孫穆雜林類事

迎年佩 咸通後士風尚於正且未明佩紫赤囊中

盛人參木香如豆樣時時傾出嚙吞之至日出乃止

號迎年佩

陶穀清異錄

姚安之人參南方惟此處產

咸寶錄



說文曰人蔘

音

出上黨

春秋運斗樞曰搖光星散

爲人形癢江淮山瀆之利則搖光不明人蔘不生

禮斗威儀曰君棄木而王有人蔘生 廣雅曰蔘地

精人蔘也 梁書曰阮孝緒母王氏忽有疾合藥須

得生人蔘舊傳鍾山所出孝緒躬歷幽險累日不逢

忽見一鹿前行孝緒感而隨後至一所遂滅就視果

獲此草母得服之遂愈 異苑曰人蔘一名土精生

上黨者佳人形皆具能作兒啼昔有人掘之始下數

鐮

音

便聞土中有呻聲尋音而取果得一頭長二尺

許四體畢備而髮有損缺處將是損傷所以呻也

石勒別傳曰初勒家園中生人參葩茂甚盛于時父  
老相者皆云此胡體奇貌異有大志量其終不可知勸  
邑人厚遇之潛夫論曰夫理世不得真賢譬猶疾不  
得真藥也疾當得真人參反得蘿菔已不識真而飲之  
病浸以劇不知爲人所欺也傳子曰先王之制九州  
異賦天不生地不養君子不以爲禮若河內諸縣去北  
山絕遠而各調出御上黨真人參上者十斤下者五十  
斤所調非所生民以爲患范子計然曰人參出上黨

乃旺也若單用補血藥血無由而生矣素問言無陽則陰無以生無陰則陽無以化故補氣須用人參血虛者亦須用之本草十劑云補可去弱人參羊肉之屬是也蓋人參補氣羊肉補形形氣者有無之象也

李杲○本草綱目

氣味震亨曰人參入手大陰與藜蘆相反服參一兩

入藜蘆一錢其功盡廢也

朱震亨○本草綱目

人參氣溫味甘甘而微苦微寒氣味俱輕陽也陽中微陰無毒

本草云主補五藏安精神定魂魄止驚悸

莖有毛三月九月採根根有頭足手面目如人 募

容晁與顧和書曰今致人參十斤

太平御覽

珍云補胃喘嗽勿用短氣用之

張元素珍珠囊  
○湯液本草

**氣味**元素曰性溫味甘微苦氣味俱薄浮而升陽中

之陽也又曰陽中微陰又曰人參得升麻引用補上

焦之元氣瀉肺中之火得茯苓引用補下焦之元氣

瀉腎中之火得麥門冬則生脉得乾薑則補氣 **主治**

治脾胃陽氣不足肺氣虛促短氣少氣補中緩中瀉

心肺脾胃中火邪止渴生津液

張元素  
本草綱目

東云治脾肺陽氣不足乃能補肺氣促短氣少氣補而緩中瀉脾肺胃中火邪善治短氣非升麻爲引用不能補上升之氣升麻一分人參三分爲相得也若補下焦元氣瀉腎中火邪茯苓爲之使心云補氣不足而瀉肺火甘溫而補陽利氣脉不足者是亡血也人參補之益脾與乾姜同用補氣裏虛則腹痛此藥補之是補不足也

李東垣藥類法象○湯液本草

平性人參

君茯苓爲之使反藜蘆惡鹹鹵凡使去淨蘆頭

味甘微寒微溫無

毒潤肺寧心開脾助胃人參

味甘性溫無毒升也



陽也其用有三止渴生津液和中益元氣肺寒則可服肺熱還傷肺人參治渴補虛安五臟快覓人參人參一曰人葠味甘微寒微溫無毒反藜蘆

李杲藥性賦

氣味杲曰得黃耆甘草乃甘溫除大熱瀉陰火補元氣又爲瘡家聖藥發明杲曰人參甘溫能補肺中元氣肺氣旺則四臟之氣皆旺精自生而形自盛肺主諸氣故也張仲景云病人汗後身熱亡血脈沉遲者下痢身涼脈微血虛者並加人參古人血脫者益氣益血不自生須得生陽氣之藥乃生陽生則陰長血

狀類人者善 廣五行記曰隋文帝時上黨有人宅  
後每夜有人呼聲求之不得去宅一里但一人參枝  
苗掘之入地五尺得人參一如人體狀去之後呼聲  
遂絕 本草曰人參味甘微寒生山谷主補五藏安  
定精神魂魄除邪止驚明目開心益智久服輕身延  
年生上黨 廬山記曰山中藥多人參 吳氏本草  
曰人參一名土精一名神草一名黃參一名血參一  
名久微一名玉精神農甘小寒桐君雷公苦岐伯黃  
帝甘無毒扁鵲有毒或生邯鄲三月生葉小銳枝黑

除邪氣明目開心益智療腸胃中冷心腹鼓痛胃脇  
逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人不  
忘〔液云〕味既甘溫調中益氣卽補肺之陽泄肺之陰  
也若便言補肺而不論陰陽寒熱何氣不足則誤矣  
若肺受寒邪宜此補之肺受火邪不宜用也肺爲天  
之地卽手太陰也爲清肅之藏貴涼而不貴熱其象  
可知若傷熱則宜沙參沙參味苦甘微寒無毒主血  
積驚氣除寒熱補中益肺氣療胃痺心腹痛結熱邪  
氣頭痛皮間邪熱安五藏補中人參補五臟之陽也

沙參苦微寒補五藏之陰也安得不異易老云用沙  
參代人參取其味甘可也葛洪云沙參主卒得諸疝  
小腹及陰中相引痛如絞自汗出欲死細末酒調服  
方寸匕立差日華子云治惡瘡疥癬及身痒排膿消  
腫毒海藏云今易老取沙參代人參取其甘也若微  
苦則補陰甘者補陽經雖云補五藏亦須各用本藏  
藥相佐使隨所引而相輔一藏也不可不知湯液  
本草  
發明好古曰潔古老人言以沙參代人參取其味甘  
也然人參補五臟之陽沙參補五臟之陰安得無異

雖云補五臟亦須各用本臟藥相佐使引之。王好古本草

綱目

人參味甘氣溫微寒氣味輕升陽也陽中微陰無毒

東北境域有陰濕山谷生。詳載下文高麗國名誌譜云三極

五葉

初生小者一極五葉年久漸生三極葉並生于極之端也

背陽向陰欲來求

我椶音樹相尋

其樹類梧桐大葉蔽日陰濃故多生樹底

種類略殊形色

弗一紫團參紫大稍匾出潞州紫團山。屬山西白條參

俗呼羊角參

白堅且圓出邊外百濟國。今臣屬高麗黃參生遼

東

遼戍地名

上黨

古郡名在冀州西南

黃潤有鬚稍纖長高麗參。俗呼



參韋近紫體虛新羅國名參亞黃味薄並堪主治須別麓

良獨黃參功易臻人銜走氣自若唐本注云凡試上黨參令一人啣之

一人不啣同走二里許不銜者必喘啣者必氣息自若此為異也肖人形神具如人形變

手足神力具全最為難得狀類雞腿力洪雷公云凡使人參之名亦因相類著

雞腿輕匏取春間因汁外萌芽拍梗春參無力雖用者良輕匏一兩不如秋參

錢一重實採秋後得汁降結暈成膠布金井王闌入方

劑極品和細辛留久不蛀每參一斤和細辛一兩本封固磁罐中永不蛀蟻草

莖

集解嘉謨曰紫團參紫色稍扁百濟參白堅且圓名

白條參俗名羊角參遼東參黃潤纖長有鬚俗名黃  
參獨勝高麗參近紫體虛新羅參亞黃味薄肖人形  
者神其類鷄腿者力洪

陳嘉謨  
本草綱目

〔正誤〕机曰節齋王綸之說本於海藏王好古但綸又  
過於矯激丹溪言虛火可補須用參芪又云陰虛潮  
熱喘嗽吐血盜汗等證四物加人參黃蘗知母又云  
好色之人肺腎受傷效嗽不愈瓊玉膏主之又云肺  
腎虛極者獨參膏主之是知陰虛勞瘵之證未嘗不  
用人參也節齋私淑丹溪者也而乃相反如此斯言

一出印定後人眼目凡遇前證不同病之宜用不宜  
輒舉以藉口致使良工掣肘惟求免夫病家之怨病  
家亦以此說橫之胷中甘受苦寒雖至上嘔下泄去  
死不遠亦不悟也古今治勞莫過於葛可久其獨參  
湯保真湯何嘗廢人參而不用耶節齋之說誠未之  
深思也

汪機本草會編  
本草綱目

正誤楊起曰人參功載本草人所共知近因病者吝  
財薄醫醫復算本惜費不肯用參療病以致輕者至  
重重者至危然有肺寒肺熱中滿血虛四證只宜散

寒消熱消脹補營不用人參其說近是殊不知各加  
人參在內護持元氣力助群藥其功更捷若曰氣無  
補法則謬矣古方治肺寒以溫肺湯肺熱以清肺湯  
中滿以分消湯血虛以養營湯皆有人參在焉所謂  
邪之所轉其氣必虛又曰養正邪自除陽旺則生陰  
血貴在配合得宜爾庸醫每謂人參不可輕用誠哉  
庸也好生君子不可輕命薄醫醫亦不可計利不用  
書此奉勉幸勿曰迂

楊起○本草綱目

高麗有生澤州易州幽州檀州者為藥無効劉子云  
蕭范之亂人參蛇床之似蘼蕪廣雅云地精人葠也  
玄覽云人參千歲為小兒枸杞千歲為犬子楓脂千

歲為琥珀

陳仁錫潛確類書

凡人參要堅實塊大而中有紫暈者佳虛泡者不中

郭履道十便良方

**修治**李言聞曰人參生時背陽故不喜見風日凡生  
宜或咀熟用宜隔紙焙之或醇酒潤透或咀焙熟用  
並忌鐵器又曰東垣李氏理脾胃瀉陰火交泰丸內



用人參皂莢是惡而不惡也古方療月閉四物湯加  
人參五靈脂是畏而不畏也又療痰在胃膈以人參  
藜蘆同用而取涌越是激其怒性也此皆精微妙奧  
非達權衡者不能知發明言聞曰人參生用氣涼熟  
用氣溫味甘補陽微苦補陰氣主生物本乎天味主  
成物本于地氣味生成陰陽之造化也涼者高秋清  
肅之氣天之陰也其性降溫者陽春生發之氣天之  
陽也其性升甘者濕土化成之味地之陽也其性浮  
苦者火土相生之味地之陰也其性沈人參氣味俱

薄氣之薄者生降熟升味之薄者生升熟降如土虛  
火旺之病則宜生參涼薄之氣以瀉火而補土是純  
用其氣也脾虛肺怯之病則宜熟參甘溫之味以補  
土而生金是純用其味也東垣以相火乘脾身熱而  
煩氣高而喘頭痛而渴脉洪而大者用黃蘗佐人參  
孫真人治夏月熱傷元氣大汗大泄欲成痿厥用生  
脉散以瀉熱火而救金水君以人參之甘寒瀉火而  
補元氣臣以麥門冬之苦甘寒清金而滋水源佐以  
五味子之酸溫生腎精而收耗氣此皆補天元之真

氣非補熱火也白飛霞云人參鍊膏服回元氣於無  
何有之鄉凡病後氣虛及肺虛嗽者並宜之若氣虛  
有火者合天門冬膏對服之正誤言聞曰孫真人云  
夏月服生脉散清暑益氣湯乃三伏瀉火益金之聖藥而  
言生脉散清暑益氣湯乃三伏瀉火益金之聖藥而  
雷數反謂發心症之患非矣症乃臍旁積氣非心病  
也人參能養正破堅積豈有發症之理觀張仲景治  
腹中寒氣上衝有頭足上下痛不可觸逆嘔不能食  
者用大建中湯可知矣又海藏王好古言人參補陽

泄陰肺寒宜用肺熱不可用節齋王綸因而和之謂  
參耆能補肺火陰虛火動失血諸病多服必死二家  
之說皆偏矣夫人參能補元陽生陰血而瀉陰火東  
垣李氏之說也明矣仲景張氏言亡血血虛並加人  
參又肺寒者去人參加乾薑無令氣壅丹溪朱氏亦  
言虛火可補參耆之屬實火可瀉苓連之屬二家不  
察三氏之精微而謂人參補火謬哉夫火與元氣不  
兩立元氣勝則邪火退人參既補元氣而又補邪火  
是反復之小人矣何以與甘草苓朮謂之四君子耶

雖然三家之言不可盡廢也惟其語有滯故守之者  
泥而執一遂視人參如蛇蝎則不可也凡人面白面  
黃面青鰲悴者皆脾肺腎氣不足可用也面赤面黑  
者氣壯神強不可用也脉之浮而芤濡虛大遲緩無  
力沉而遲濇弱細結代無力者皆虛而不足可用也  
若弦長緊實滑數有力者皆火鬱內實不可用也潔  
古謂喘嗽勿用者痰實氣壅之喘也若腎虛氣短喘  
促者必用也仲景謂肺寒而欬勿用者寒束熱邪壅  
鬱在肺之欬也若自汗惡寒而欬者必用也東垣謂



久病鬱熱在肺勿用者乃鬱于內宜發不宜補也若肺虛火旺氣短自汗者必用也丹溪言諸痛不可驟用者乃邪氣方銳宜散不宜補也若裏虛吐利及久病胃弱虛痛喜按者必用也節齋謂陰虛火旺勿用者乃血虛火亢能食脉弦而數涼之則傷胃溫之則傷肺不受補者也若自汗氣短肢寒脉虛者必用也如此詳審則人參之可用不可用思過半矣

李言聞人參傳

○本草綱目

人參味甘性微溫無毒入肺經補氣活血止渴生津

肺寒可服肺熱傷肺去蘆用茯苓爲使惡鹵鹹反藜蘆按參之用臟腑均補何力之宏也蓋人生以氣爲樞而肺主氣經所謂相傳之官治節出焉參能補氣故宜入肺肺得其補則治節咸宜氣行而血因以活矣古方用以解散亦血行風自滅之意也至於津液藏於膀胱實上連於肺故有生津液之功肺寒者氣虛血滯故曰可服肺熱者火炎氣逆血脉激行參主上升且能瀉血故肺受傷也性本疏通人多泥其作飽不知少服則壅多則反宜通矣

雷公云

凡使要肥

大塊如雞腿者似人形者採得臨乾去四邊蘆鎬補頭并黑者列入藥中夏中少使發心法之患也雷公

炮製藥性解

人參釋名

人蔘

音參或省作蔘

時珍曰人蔘年深浸漸長成

者根如人形有神故謂之人蔘神草蔘字從浸亦浸漸之義漫即浸字後世因字文繁遂以參星之字代之從簡便爾然承誤日久亦不能變矣惟張仲景傷寒論尚作蔘字別錄一名人微微乃蔘字之訛也其成有階級故曰人銜其草背陽向陰故曰鬼蓋其在五參色黃屬土而補脾胃生陰血故有黃參血參之

名得地之精靈故有土精地精之名廣五行記云隋文帝時上黨有人宅後每夜聞人呼聲求之不得去宅一里許見人參枝葉異常堀之入地五尺得人漫一如人體四肢畢備呼聲遂絕觀此則土精之名尤可證也禮斗威儀云下有人參上有紫氣春秋運斗樞云搖光星散而爲人參人君廢山瀆之利則搖光不明人參不生觀之則神草之名又可證矣集解時珍曰上黨今潞州也民以人參爲地方害不復采取今所用者皆是遼參其高麗百濟新羅三國今屬於

朝鮮矣其參猶來中國互市亦可收子於十月下種  
如種菜法秋冬采者堅實春夏采者虛軟非地產有  
虛實也遼參連皮者黃潤色如防風去皮者堅白如  
粉偽者皆以沙參薺芩桔梗采根造作亂之沙參體  
虛無心而味淡薺芩體虛無心桔梗體堅有心而味  
苦人參體實有心而味甘微帶苦自有餘味俗名金  
井玉闌也其似人形者謂之孩兒參尤多贗偽宋蘇  
頌圖經本草所繪潞州者三桮五葉真人參也其潞  
州者乃沙參之苗葉心州兗州者皆薺芩之苗葉其



所云江淮土人參者亦薺菴也並失之詳審今潞州者尚不可得則他處者尤不足信矣近又有薄夫以人參完浸取汁自啜乃晒乾復售謂之湯參全不任用不可不察考月池翁諱言聞字子郁銜太醫吏目嘗著人參傳上下卷甚詳不能備錄亦略節要語於下條云耳

**主治** 治男婦一切虛證發熱自汗眩暈頭

痛反胃吐食痠瘧滑瀉久痢小便頻數淋瀝勞倦內

傷中風中暑痿痺吐血嗽血下血血淋血崩胎前產

後諸病

本草綱目

人參說文曰人獲出上黨獲卽參也所以名爲人參

者水經云如人形者有神范蠡計然亦曰狀類人者

善海藥云出新羅國所貢有手腳狀如人形長尺餘

或云生邯鄲者根有頭足手面目如人或曰生上黨

者人形皆具上等參神力具全最爲難得而人參之

名亦因相類著也味甘微寒微溫無毒主補五臟安

開心益智療腸胃中冷心痛鼓痛胸脇逆滿霍亂吐

逆調中止消渴通血脉破堅積令人不忘久服輕身

延年和細辛久留不蛀。遼東上黨者形狀如防

風而潤實色黃有鬚梢纖長嚼之苦甘此品極佳。

高麗國人作人參讚曰三桎五葉背陽向陰欲來求

我擬樹相尋。世多以桔梗造參欺人形像亦大相

似亦有金井玉欄但皮無橫紋味亦淡薄不同耳

○世之市者皆繩縛竿上

蒸過故上有繩痕買者不識惟要透明似肉近蘆有鬚紋者則假參自不得紊之凡用宜擇秋參勿用春參輕飽因汁升萌芽抽梗秋參重實得汁降結暈成膠○市有小塊色白堅實明亮近蘆頭有紋亦有無紋者市呼清河堪入劑用氣味較之上黨次之○紫團參紫大稍扁出紫團山白條參白堅且圓出百濟國高麗參近紫體虛新羅參亞黃味薄諸參並堪主治獨上黨黃參功效易臻唐本註云欲試上黨人參

昔當使二人同走一與參舍之度走三五里許其不

舍者必大喘舍者氣息自如

雷公云

凡使要肥大塊如鷄腿并

似人形者揀得陰乾去四邊蘆頭并黑本草  
昔劉入藥中夏中少使發心虛之患也原始

藥性相反

人參與藜蘆相反

典籍便覽

人參味甘微苦氣溫無毒入肺脾二經

李時珍曰人參年深者根

如人形故謂之人參茂固字繁故以參字代之其在五  
參色黃屬土而補脾胃生陰血故有黃參血參之名

春秋運斗樞云搖光散而為人參人君廢山瀆之利  
則搖光不明人參不生○別錄曰人參生上黨山谷

及遼東或生邯鄲百濟潞州太行紫團山今心州遼  
州澤州箕州平州易州檀州幽州媯州并州並出人

參蓋其山皆與太行連接故也○蘇氏曰人參生于  
深山背陽向陰近根漆樹下濕潤處下有人參則上

有紫氣春生苗四五相對一莖直上一極五葉四五  
年後生兩極至十年後生三極年深者生四極各五  
葉中心生一莖俗名百尺杆三四月作莖如絲開花  
紫白色細小如粟秋後結子或七八枚如百豆生青  
熟紅自落秋後采根堅實堪用泰山出者葉幹青根  
白珠別○江淮間出一種土人參苗長一二尺葉如  
匙而小與桔梗相似葉對生五七節根亦如桔梗而  
柔味極甘美秋生紫花又帶青色初冬采根土人或  
用之○陳氏曰紫團參色紫形稍扁百濟參堅白且  
圓俗名白條參又名羊角參遼東參黃潤纖長有鬚  
俗名黃參高麗參微紫體虛新羅參色黃味薄○上  
黨今潞州也民以人參為地方害不復采取今所用  
者皆是遼參其高麗百濟新羅三國今皆属于朝鮮  
矣其參猶來中國互市亦可用收子于十月下種如  
種萊法秋冬采者堅實春夏采者虛軟非地有虛實  
也遼參連皮者黃潤色如防風去皮者堅白如粉偽  
者嘗以沙參薺芫桔梗采根造作亂之但沙參體虛  
無心而味淡薺芫體虛無心而味甘桔梗體堅有心



而味苦人參體實有心而味甘微苦自有餘味○宋蘇頌圖經本草所云潞州者三極五葉其潞州者乃沙參之苗葉心刈充刈者皆薺范之苗葉所云江淮土人參者亦薺范也○人參生時背陽向陰故不喜見風日見風日則易蛀惟納新瓦器中密封可經年不損或用華陰細辛與參相間收之不蛀不壞凡使以銅刀切片用○人參補氣生血助津養神之藥也故真氣

衰弱短促虛喘以之補之如榮衛空虛用之可治也精神散亂魂魄飛揚以此斂之如陽亡陰脫用之可同也驚悸怔忡健忘恍惚以此寧之如心志懶怯用之可壯也元神不足虛羸乏力以此培之如中氣衰陷用之可升也又若汗下過多津液失守用之可以

生津而止渴脾胃衰薄飲食減常或吐或嘔用之可以和中而健脾小兒痘瘡灰白倒陷用之可以起痘而行漿婦人產理失順用力過度用之可以益氣而達產若久病元虛六脉空大者吐血過多面色痿白者瘡痢日久精神委頓者中熱傷暑汗竭神疲者血崩潰亂身寒脉微者內傷傷寒邪實正虛者風虛眼黑旋暈卒倒者皆可用也如本草所云補益之外又能除邪氣破堅積者何耶觀邪氣之所以留而不去者無他由真氣虛則不能敵故畱連而不解也茲得

補而真元充實則邪自不容譬如君子當陽則小人  
自退矣破堅積者亦由真氣不足則不能健行而磨  
物日積月累遂成堅積譬夫磨孔納物無力則不轉  
不轉則物停積矣脾主運化真陽之氣同脾強而能  
消又何堅積之不磨哉○仲景云病人亡血亡汗身  
熱脉沉遲者倍加人參古人以血脫者宜益氣蓋血  
不自生須得生陽氣之藥乃生素問言無陽則陰無  
以生無陰則陽無以化人參能補氣故血虛者宜用  
之也又東垣以相火乘脾身熱而煩氣高而喘頭痛

而渴脉洪而大者用人參佐黃栢又孫真人治夏月  
熱傷元氣汗大泄欲成痿厥者用人參麥冬五味以  
瀉熱火而救金水此皆補天元之真氣非補熱火也  
又白朮霞以人參煉膏服同元氣于無何有之鄉若  
氣虛有火者合天門冬膏時服之又王安道謂人參  
黃耆甘草乃甘溫除大熱瀉陰火補元氣亦爲瘡毒  
膿潰聖藥此皆神而明之配合得宜者也凡人面白  
面黃面青鰲悴者皆脾肺腎氣不足可用也面赤面  
黑氣壯神強者不可用也脉之浮而芤虛濡大遲緩

無力沉而遲濡細弱結代無力者皆虛而不足可用也若弦長緊實滑數有力者皆火鬱內實不可用也潔古謂喘嗽勿用者痰實氣壅之喘也若腎虛氣短喘促者必用也仲景謂肺寒而咳勿用者寒裏熱邪痰壅在肺之咳也若自汗惡寒而咳者必用也東垣謂久病鬱熱在肺勿用者乃火鬱于內宜發不可補也若肺虛火旺氣短自汗者必用也丹溪言諸痛不可驟用者乃邪氣方銳宜散不宜補也若裏虛吐利及久病胃弱虛痛喜按者必用也如此推詳則人參



之可用不可用思過半矣○繆仲淳先生云論人參  
功能之廣不可盡述第其性亦有所不宜用者世之  
錄其長者或遺其短摘其瑕者并棄其瑜是以或當  
用而後時或非宜而妄投不蒙其利徒見其害二者  
之誤其失則一遂使良藥不見信于世粗工互騰其  
口說惜哉豈知人參本補五藏真陽之氣者也若夫  
虛羸尪怯勞役饑飽所傷努力失血以致陽氣短乏  
陷入陰分發熱倦怠四肢無力或中熱傷暑暑傷氣  
無氣以動或嘔吐泄瀉胃弱不能食脾虛不磨食或

真陽衰少腎氣乏絕陽道不舉完穀不化□□清□  
中風失音產後血崩小兒□驚吐瀉不止痘後氣虛  
潰瘍長肉等證投之靡不立効惟不利于肺家有熱  
咳嗽吐痰吐血衄血齒衄內熱骨蒸勞瘵陰虛火動  
之候蓋肺者華蓋之藏也位乎上象天屬金喜清肅  
而惡煩熱真氣無虧則寧謐清淨以受生氣之熏蒸  
而朝百脉苟縱恣情慾虧損真陰火空則發熱起于  
下炎燥乎上則肺先受之火乃肺之賊邪邪氣勝則  
實實則肺熱鬱結爲痰喉癢而發嗽血熱妄行溢出

上竅王好古所謂肺熱還傷肺是已又有痧癘初發身雖熱而斑點未形傷寒始作形證未定而邪熱方熾若誤投之鮮克免者可不戒哉可不慎哉○盧不遠先生曰人參功力安定精神魂魄意志于倉忙紛亂之際轉危爲安定亡爲存經云人身衛氣日行陽道則寤夜入五藏則寐則凡病劇悵惶不能假寐者人參入口便得安寢此卽入藏養陰安精神定魂魄之外徵矣○金靈昭先生云以言乎天則得生生升發之氣以言乎地則得清陽至和之質以言乎人故

能回元氣于無絕却虛邪于俄頃養人身藏府氣血

肉液之精參兩間而合人參之故曰人參

本草  
彙言

製人參法 擇好孩兒黃揀參結實者用蜜水潤軟

絹袋盛貯入酒米飯內蒸三次晒乾爲極細末聽用

人參性微熱味苦氣微厚能潤肺生津補諸虛不足

生氣主脉乃藥中之聖藥也

遵生  
八牋

參在本地價甚不高中國人轉市之度山海諸關納

稅而上之人求索無窮近日加以內監高淮每一檄

取動以數百斤計故數年以來佳者絕不至京師其

中上者亦幾與白繻同價矣王荊公有言平生無紫  
團參亦活到今日今深山荒谷之民茹草食藿不知  
藥物爲何事而疆壯壽考不聞疾病惟富貴膏粱之  
家子弟婦人起居無節食息不調而輒恃參朮之功  
速貴害若不可須臾離者卒之病殤夭札相繼不絕  
亦何益之有哉

五雜  
組

人參之幹特生在在有之春州者最良亦有生熟二  
等生者色白而虛入藥則味全然而涉夏則損蟲不  
若經湯釜而熟者可久留舊傳形匾者謂麗人以石



壓去汁作煎今詢之非也乃參之熟者積塚而致爾其作煎當自有法也館中日供食菜亦謂之沙參形

大而脆美非藥中所宜用

徐兢高麗圖經

高麗誌護云三桮五葉初生小者一桮五葉年久漸生三桮葉並生子桮之端也背陽向陰欲來求我椶

音假樹相尋其樹類梧桐大葉蔽日陰濃故多生樹底

種類略殊形色第一紫團參紫大稍匾出潞州紫團

山屬山西白條參俗呼羊角參白堅且圓出邊外百

濟國今臣屬高麗黃參生遼東上黨

古郡名在冀州西南黃潤

有鬚稍纖長高麗參俗呼韃參近紫體虛新羅

國參名

亞黃味薄並堪主治須別麋良獨黃參功效易臻人  
啣走氣息自若唐本注云凡試上黨參令一人啣之  
一人不啣同走二里許不啣者必喘啣者氣息自若  
此爲異也肖人形神具如人形雙手足者神力俱全  
最爲難得而人參之名亦因相類著也類雞腿力洪  
雷公云凡使大塊類雞腿者良輕匏取春間因汁升  
萌芽抽梗春參無力雖用一兩不如秋參一錢重實  
採秋後得汁降結暈成膠布金井玉闌入方劑極品

和細辛留久不蛀每參一劄和細辛一兩封固磁罐

中永不蛀壞去蘆梗咀薄纔煎

葦莖花木鳥獸珍玩考

人參生上黨山谷及遼東河東諸州泰山皆有之又  
有河北淮揚及閩中來者名新羅人參然俱不及上  
黨者佳其根形狀如防風而潤實春生苗三月四月  
有花細小如粟莖如絲紫白色秋後結子根如人形  
者神泰山出者葉簞青根白殊別江淮出一種土人  
參葉如匙而小與桔梗相似味極甘美相傳欲試上  
黨人參者當使二人同走與一人參舍之一不與度

走三五里許其不啗人參者必大喘啗者氣息自如  
其人參乃真也一名人銜一名鬼蓋一名神草一名  
人微一名土精一名血參如人形者有神味甘微寒  
微溫無毒主五臟氣不足勞傷虛損久服輕身延年

三才  
圖會

沂陽生曰參者參也名人參參三才也諸藥以人參  
爲主猶人以穀氣爲主故御佳穀者必先飯則油膩  
不溜下而爲洞泄諸藥非參曷運行但視病虛實爲

多憂耳

王文祿  
醫光

人參子熟時收取於十月下種一如種菜法若春初生苗時移根種之亦可活

群芳譜

本草圖經曰人參生上黨山谷及遼東今江東諸州及泰山皆有又有自閩中來者名新羅人參又有沙參出海濱泉崇武所大岵山下有之

閩書南產志

人參味甘氣溫微寒氣味俱輕可升可降陽中有陰無毒乃補氣之聖藥活人之靈苗也能入五臟六腑無經不到非僅入脾肺心而不入肝腎也五臟之中尤專入肺入脾其入心者十之八入肝者十之五入



腎者十之三耳世人止知人參爲脾肺心經之藥而不知其能入肝入腎但肝腎爲至陰之經人參氣味陽多于陰少用則泛上多用則沉下故遇肝腎之痛必須多用之于補血補精之中助山藥熟地純陰之藥使陰中有陽反能生血生精易也蓋天地之道陽根于陰陰亦根于陽無陰則陽不生而無陽則陰不長實有至理非好奇也有如氣喘之症乃腎氣之欲絕也宜補腎以轉逆故必用人參如能回元陽于頃刻非人參入腎何能神效如此又如傷寒厥症手足

逆冷此肝氣之逆也乃用四逆等湯亦必多加人參而始能定厥非人參入肝又何能至此是人參入肝腎二經可共信而無疑也惟是不善用人參者往往取敗蓋人參乃君藥宜同諸藥共用始易成功如健氣也必加升麻柴胡如和中也必加陳皮甘草如健脾也必加茯苓白朮如定怔忡也必加遠志棗仁如止咳嗽也必加薄荷蘇葉如消痰也必加半夏白芥子如降胃火也必加石膏知母如清陰寒也必加附子乾薑如敗毒也必加苓連梔子如下食也必加大

黃枳實用之補則補用之攻則攻視乎配合得宜輕重得法耳然而人參亦有單用一味而成功有如獨參湯乃一時權宜非可恃爲常服也蓋人氣脫于一時血失于頃刻精走于須臾陽絕于旦夕他藥緩不濟事必須用人參一二兩或四五兩作一劑煎服以救之否則陽氣遽敗而死實此時未嘗不可禱之他藥共相挽回誠恐牽制其手反致功效之緩不能反之于無何有之鄉一至陽回氣轉急以他藥佐之纔得其不再絕耳否則陰寒逼人又恐變生則可見人

參必須有轉佐之品相濟成功未可專恃一味期于  
必勝也○或疑人參乃氣分之藥而先生謂是入肝  
入腎意者亦血分之藥乎夫人參豈特血分之藥哉  
實亦至陰之藥也肝中之血得人參則易至也人以  
人參爲氣分之藥絕不用之以療肝腎此醫道之所  
以不明也但人參價貴貧人不能長服爲可傷耳○  
或疑人參既是入腎之藥腎中虛火上冲以致肺中  
氣滿而作嗽亦可用乎此又不知人參之故也夫腎  
中水虛用參可以補水腎中火動用參反助火矣蓋

人參入肝入腎止能補血添精亦必得歸為熟地山藥同群以共濟欲其一味自入于肝腎之中勢亦能如腎中陰虛火動此水不足而火有餘必須補水以制火而凡有溫熱之品斷不可用卽如破故杜仲之類未嘗非直入腎中之味亦不可同山藥熟地而並用況人參湯多于陰之物烏可輕投其不可同用明甚不知忌而妄用之則肺氣更滿而嗽且益甚所謂肺熱還傷肺者此類是也至火衰而陰虛者人參宜重用腎中下寒之劇則龍雷之火不能藏于至陰之



中勢必直冲而上至于咽喉往々上熱之極而下身  
反畏寒而足如冰者有之倘以爲氣而投以苓連施  
柏之類則火焰愈熾苟用人參同附子桂薑之類以  
徒治之則火自退藏消歸烏有矣蓋虛火不同有陽  
旺而陰消者有陰旺而陽消者正不可執之概用人  
參以治虛火也○或問人參乃純正之品何故攻邪  
反用之耶不知人參乃攻邪之勝藥也凡人邪氣入  
身皆因氣虛不能外衛于皮毛而後風寒暑濕熱燥  
之六氣始能中之是邪由虛入而攻邪可不用參以

補氣乎然而用參以攻邪亦未可冒昧也當邪之初  
入也宜少用參以爲佐及邪之深入也宜多用參以  
爲君及邪之將去也宜專用參以爲主斟酌于多寡  
之間審量于先後之際又何參之不可用而邪之不  
可攻哉故邪逼其氣陷之至陰之中非人參何能升  
之于至陽之上邪逼其氣逆于胸膈之上非人參何  
能瀉之于膀胱之下近人一見用人參病家先吃驚  
病人知之有死之心無生之氣又胡能取効哉誰知  
邪之所湊且氣必虛用人參于攻邪之中始能萬無

一失余不得不暢言之以活人于萬世也○用人參于攻邪之中亦自有說邪之輕者不必用也人之壯實者不必用也唯邪之勢重而人之氣虛不得不加人參于攻藥之中非助其攻乃補其虛也補虛邪自退矣○或問人參陽藥自宜補陽今曰兼陰又宜補陰是人參陰陽兼補之藥何以陽病用參而卽宜陰病用參反未安也不知人參陽多陰少陽虛者陰必虛陽旺者陰必旺陽虛補陽無碍于陰故補陽而陽受其益補陽而陰亦受其益也陽旺補陽更助其陽

必有火盛之虞陽火盛則陰水必衰陰水衰而陽火更盛陽且無補益之宜又安望其補陰乎故謂人參不能補陰非也人參但能補陽虛之陰不能補陽旺之陰耳又何疑于人參之是陽而非陰哉○或問人參不能補陽旺之陰自是千秋絕論然吾以爲補陰之藥中少加人參似亦無碍使陰得陽而陽生不識可乎此真窺陰陽之微而瀉識人參之功用也但用人參于補陰之中不制參于補陰之內亦有動火之虞而制參之法何如參之所惡者五靈脂研細末用一

分將水包之欲用參一錢投之五靈脂水內卽時取  
起入于諸陰藥之內但助陰以生水斷不助陽以生  
火此又千秋不傳之秘余得異人之授親試有驗公  
告天下以共救陽旺陰虛之症也

李巖評云此人未  
知用參以救陽旺

陰虛者所以寡效今得  
此方可以善用之矣

○或問喘脹之病往往用參

而更甚是人參氣藥以動氣也吾子不言治喘腸深  
有早見嗟乎人參定喘之神方除脹之仙藥如何說  
氣藥動氣耶夫喘症不同有外感之喘有內傷之喘  
有外感之脹有內傷之脹外感之喘乃風邪入于肺



也用葛根柴胡又瓜粉桔梗陳皮黃芩之類卽愈固  
非人參所能治也若內傷之喘乃平日大虧其脾胃  
之氣一時氣動挾相火而上冲咽喉覺臍下一羶之  
氣升騰出胸膈直奔而脩喘欲眠不能欲行更甚其  
狀雖無非肩脩聲之象然實較外感之症而大重蓋  
病乃氣不歸厚腎氣虛絕下無藏身之地不得不上  
而相冲看其氣若盛而實虛非有餘之症乃不足之  
症也此時若用外感之藥則氣更消亡不得不用人  
參以挽回于全絕然而少用則泛上轉覺助喘必須

用至一二兩則人參如能下行生氣于無何有之鄉  
氣轉其逆而喘可定也外感之脹乃水邪也按之皮  
肉必如泥土之可捻用牽牛甘遂各二錢瀉之一利  
水而症愈不必借重人參也若內傷之脹似水而非  
水乃脾胃之氣大虛脹而非實脹也此時若作水治  
則氣脫而脹益甚不得用人參健脾胃之氣然驟  
用人參則脾胃過弱轉不能遽受反作飽滿之狀久  
則胃氣開而脾氣亦健漸漸加用人參飽滿除而脹  
亦盡消也誰謂人參非治喘脹者哉○或問人參乃

升提氣分之藥今用之以定喘是又至陰之藥也吾  
子言人參入腎信矣然何以舍喘之外別不能用參  
以補腎此予所未解也曰人參入腎乃一時權宜非  
中和之道也大凡氣絕者必皆宜用人參以救之蓋  
氣絕非緩藥可救而腎水非補陰之藥可以速生人  
參是氣分之藥而又兼陰分所以陽生而陰亦生救  
元陽正所以救真陰也君以爲舍喘之外別不能用  
人參以補腎吾以爲凡參救絕者無非補腎也腎氣  
不生絕必難復然則救絕者正救腎也故腎不至絕

不必用參腎既至絕不得不用參矣○或問人參生  
氣者也有時不能生氣而反破氣其故何也夫人參  
生氣而不破氣者也不破氣而有時如破氣者蓋肺  
氣之火旺也肺氣旺則脾氣亦旺肺氣之旺因脾氣  
之旺而旺也用人參以助氣則脾愈旺矣脾旺而肺  
有不益旺者于是咳嗽脹滿之病增人以爲人參之  
破肺氣也誰知是人參之生脾氣乎夫脾本生肺助  
氣以生肺之不足則肺受益助氣以生肺之有餘則  
肺受損惟是肺氣天下未有有餘者也何以補其不

足而反現有餘之象因肺中有邪火而不得散不制其剋肺金之邪而反補其益肺金之氣此肺金之全不受生而轉且受剋也然則治之法制其邪火而兼益其肺氣則自得人參之生不得人參之破矣人烏可舍人參而徒瀉肺氣哉○或問人參健脾土之旺以剋水者也何以水濕之症用人參而愈加腫脹乎曰此非人參之不健脾土乃脾土之不能制膏水耳腎水必得脾土之旺而水乃不敢泛濫于中州惟其土之不堅而後水之大旺欲制水必健土矣健土之



藥舍人參何求然而土之所不堅者又因于火之太微也火在水之中不存水之外補土必須補火而補火必有水之中補之用人參以健土是尅水也尅水則火愈微矣火愈微則水愈旺水愈旺而土自崩又何能尅水哉故水脹之病愈服人參而愈脹也然則治之法奈何先補水以生火後補火以生土用人參于補腎之中亟生火于水之內徐用人參于補腎之內再生土于火之中自然腎生水而水不泛腎生火而土不崩又何必去人參以防其增脹哉○或又問

補火以生土則土自不崩補水以生火欲水之不泛  
難矣豈人參同補腎藥用之即可制水以生火乎曰  
水宜補以消之不宜制以激之水火之不相離也補  
火不補水則火不能生補水更補火則水不能泛補  
水以生火者卽于水中補火也益之以人參者以人  
參同補腎之藥兼施則人參又能入腎便陽氣通于  
腎內而火尤易生蓋陰無陽不長腎水得陽氣而變  
化腎火卽隨陽氣而升騰然而人參終是侵脾之物  
自然引火而出于腎內入于脾矣火旣入脾土自得

養是人參乃助水以生火非尅水以生土也又何疑  
于補水而水泛哉○或疑人參功用非一言可盡宜  
予之辨論無窮然吾恐議論多而成功少反不若從  
前簡直捷痛快之爲妙也嗟乎余豈好辨哉其不得  
已之心竊比于子輿氏耳蓋當今之世非畏人參卽  
亂用人參畏用之弊宜用而不用亂用之弊不當用而  
妄用二者皆能殺人余所以辨人參之功增畏用者  
之胆辨人參之過誅亂用者之心○或疑人參補氣  
血之虛虛卽用人參可矣何必問其症而先生多論

若此恐世人必疑反不敢用人參雖曰用人參不可  
無識而識生于胆之中故必講其功過使功過既明  
胆識並到自然隨症用參無先後之皆謬無多寡之  
參差無遲速之舛錯既收其功而又絕其害矣○或  
問人參陽藥何以陰分之病用之往往成功先生謂  
陰非陽不生是矣然而世人執此以治陰虛之病有  
時而火愈旺豈非陰虛不宜參之明徵乎古人云肺  
熱還傷肺似于言參之能助肺火也夫人參何能助  
火哉人參但能助陽氣耳陰陽雖分氣血其實氣中

又分陰陽也陰氣必得陽氣而始生陽氣必得陰氣而始作陰陽之相根原在氣之中也人參助陽氣者十之七助陰氣者十之二于補陰藥中少用人參以生陽氣則陽生而陰愈旺倘補陰藥中多用人參以生陰氣則陽生而陰愈虧故用參補陰斷宜少用而非絕不可用也○或問先生聞發各病用人參之義既詳且盡而獨于傷寒症中畧而不言豈傷寒果不可以用參乎不知傷寒虛症必須用參而壞症尤宜用參也虛症如傷寒脉浮緊遍身疼痛自宜用麻黃



湯矣但其人尺脉遲而無力者又不可輕汗以榮中  
之氣血虧少故耳氣血虧少不勝發汗必須仍用麻  
黃湯而多加人參以補之使元氣充是能生氣血于  
無何有之鄉庶乎可矣倘少用人參而多加麻黃則  
元氣既虛力難勝任亦取敗之道也○或問傷寒臟  
結亦可用人參以救之乎夫臟結之病乃陰虛而感  
陰邪原是死症非人參可救然舍人參又無他藥可  
救也蓋人參能通達上下回原陽之絕返丹田之陰  
雖不能盡人而救其必生亦可于死中而療其不死

也○或問傷寒煩躁亦可用人參乎夫煩躁不同有下後而煩躁者有不下而煩躁者不下而煩躁者乃邪盛而作柴斷不可用人參若下後而煩躁乃陰陽虛極不能養心與膈中也須用人參矣但其中陰虛陽虛固不同必須分別陰虛者宜于補陰之中少用人參以補陰陽虛者宜于補陽之中多人參以補陽而陰虛陽虛所以辨之陰虛者夜重而日輕陽虛者日重而夜輕也○或問陽明病譫語而發潮熱脉滑而疾明是邪有餘也用承氣湯不大便而脉反變

爲微澁而弱非邪感而津液乾乎欲攻邪而正氣益  
虛欲補正而邪又未散此際亦可用人參乎嗟乎舍  
人參又何以奪命哉惟是用參不敢據爲必生耳法  
當用人參一兩大黃一錢同煎治之得大便而氣不  
脫者卽生否則未可信其不死○或問先生謂傷寒  
壞症尤宜用參不識何以用之夫壞症者不宜汗而  
汗之不宜吐而吐之不宜下而下之也三者皆損傷  
胃氣救胃氣之損傷非人參又何以奏功乎故不宜  
汗而汗之必用人參而汗始收不宜吐而吐之必用

人參而吐始安不宜下而下之必用人參而下始止也用人參則危可變安死可變生然不多加分兩則功力有限亦未必汗吐下皆救也○或問傷寒傳經入于少陰手足四逆惡寒嘔吐而身又倦卧脉傷不至心不煩而發躁是傷已外越而陰亦雖絕也用人參于附子之中亦能救乎嗟乎陰陽兩絕本不可救然用人參于附子之中往往有生者蓋真陰真陽最易脫而最難絕也有一錢之根則救陽而陽即回救陰而陰即續也以真陰真陽原自無形非有形可比

寧用參附以生氣于無何有之鄉斷不可先信爲無功盡棄人參不用使亡魂夜哭耳○或問傷寒傳經入少陰脉微細欲絕汗出不煩上吐血下又利不治之症也亦可用人參以救之乎夫舍人參又何以救之哉但須加入理中湯內急固其腎中之陽否則真陽擾亂頃刻奔散單恃人參亦無益矣○或問傷寒下利每日十餘次下多亡陰宜脉之虛矣今不虛而反寔亦可用人參以補其虛乎夫下利旣多脉不現虛而反現寔非脉之正氣實乃脉之邪氣實也邪實



似乎不可補正殊不知正虛而益見邪盛不亟補正則邪盛而正必脫矣論此症亦死症也于死中求生舍人參實無別藥雖然徒用人參而不用分消水邪之味佐之則人參亦不能建非常之功宜用人參一二兩加茯苓五六錢同服庶正氣不脫而水邪可止也○呂道人總批曰今人不比古人之強壯無病之時尚不可缺人參以補氣況抱病之時消燥真氣乎是人參非惟宜用宜多用也但不知人參之功用胃味用之而不中肯綮往往不得參之益反得參之損

此陳子遠公憫之欲辨明人參功用以告世著人參  
因著本草也余讀之而驚其奇遂條評之有贊嘆而  
無褒貶因其所論折衷于正非一偏之辭也況本草  
何書一言之誤流害萬世可阿其所好乎道人實心  
醉此書又總評之如此

本草  
新編

本草通串卷三





本草通串 一

日本古典全集之内

編纂者

正宗 敦夫

發行者

東京市豊島區長崎東町三丁目一六一  
合資 日本古典全集刊行會  
代表社員 長嶋 東 一

印刷者

東京市芝區金杉新濱町一二一  
單式印刷株式會社 和田助一

發行所

東京市豊島區長崎東町三丁目六一  
合資 日本古典全集刊行會  
振替東京七三〇三二

昭和十二年十二月二十日印刷  
昭和十二年十二月廿五日發行

【非賣品】











UNIVERSITY OF TORONTO  
LIBRARY

WILLIAM H. DONNER  
COLLECTION

*purchased from  
a gift by*

THE DONNER CANADIAN  
FOUNDATION

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 03056 4397



RS  
180  
J3S8  
1937  
v.1